ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Miembros de la Comisión Consultiva de AILIMPO:

citrosol stay fresh with innovation

DECCO

AgroFresh We Grow Confidence™

Sani Fruit Healthy Fruiture

Manual de Materias Activas y Recomendaciones en Tratamientos para Limón y Pomelo (pre y postcosecha)

Versión nº 17. Rev00 (10/11/2023)

Miembros de la Comisión Consultiva de AILIMPO:

Manual de Materias Activas y Recomendaciones en Tratamientos para Limón y Pomelo (pre y postcosecha)

Versión nº 17. Rev00 (10/11/2023)

INDICE *(1 de 2)*

LISTADO DE PRODUCTOS POR PLAGA/ ENFERMEDAD ..... Pág. 4

- Piojo blanco *(Aspidiotus nerii)* ..... Pág. 4
- Piojo rojo de California (*Aonidiella aurantii*) ..... Pág. 5
- Piojo gris (*Parlatoria pergandii*) ..... Pág. 7
- Serpetas (*Cornuapsis beckii, Insulaspis gloverii)* ..... Pág. 9
- Caparreta (*Saissetia oleae*) ..... Pág. 10
- Cotonet (*Planococcus citri*) ..... Pág. 11
- Otras conchinillas ..... Pág. 12
- Polilla del limonero (*Prays citri*) ..... Pág. 13
- Cacoecia (*Cacoecimorpha pronubana*) ..... Pág. 13
- Mosca de la fruta (*Ceratitis capitata*) ..... Pág. 14
- Mosca blanca (*Aleurotrixus floccosus*) ..... Pág. 15
- Mosquito verde (*Empoasca spp.*) ..... Pág. 16
- Pulgones ..... Pág. 17
- Minador (*Phyllocnistis citrella*) ..... Pág. 18
- Trips ..... Pág. 18
- Ácaro Rojo (*Panonychus citri*) ..... Pág. 19
- Araña Amarilla (*Tetranychus urticae*) ..... Pág. 20

Miembros de la Comisión Consultiva de AILIMPO:

Manual de Materias Activas y Recomendaciones en Tratamientos para Limón y Pomelo (pre y postcosecha)

Versión nº 17. Rev00 (10/11/2023)

INDICE *(2 de 2)*

- Ácaro oriental (*Eutetranychus orientalis*) ..... Pág. 21
- Ácaro de las maravillas (*Aceria sheldoni*) ..... Pág. 22
- Caracoles y babosas ..... Pág. 22
- Aguado (*Phytophthora spp.*) ..... Pág. 23
- Podredumbre del cuello o gomosis (*Phytophthora spp.*) ..... Pág. 26
- Bacteriosis ..... Pág. 29
- Mal seco (*Plenodomus tracheiphilus*) ..... Pág. 30
- Armillaria (*Armillaria mellea*) ..... Pág. 30
- Nemátodos ..... Pág. 30
- *Penicillium* ..... Pág. 30
- Otros hongos ..... Pág. 30
- HERBICIDAS ..... Pág. 31
- FITOREGULADORES (aumento tamaño/ cuajado/ evitar caída/ regular crecimiento) ..... Pág. 34
- POSTCOSECHA (hongos/ desverdizado/mejora calidad/ retraso envejecimiento/ evitar pérdida peso) ..... Pág. 35
- POSTCOSECHA LIBRES DE PESTICIDAS ..... Pág. 37
- NOTAS ..... Pág. 42

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Piojo blanco *(Aspidiotus nerii)*	ACEITE DE NARANJA	LIMOCIDE J	ES-01273	8 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89	-	-
		LIMOCIDE	ES-00674	8 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 54,6 %	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 65,4 %	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos	-	-
		ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246					
		BENOIL NARANJOS	13073	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos. Máximo 2 aplicaciones		
		AGROACEITE BLANCO	14620					
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CITROLE	20036	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CEKUOIL-V83	17195					
		PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear		
		LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos		
		ESTIUOIL	ES-00290					
		INSECTOIL KEY	ES-00291					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVIPRON-TOP	ES-00079	20-30 l/ha	20	2-4 aplicaciones intervalos 7 días	-	-
		OVISPRAY	ES-00090	22,5-40 l/ha	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 81,7 %	OVIPHYT	13557	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	LUQSOL PREMIUM BLUE	13074	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
		BELPROIL-A	13141					
		AGROACEITE	13659					
		AGROIL	22319					
	ACETAMIPRID	CARNADINE	ES-00629	0,05-0,07 l/Hl	30	No aplicar durante periodo de floración. Máximo 2 aplicaciones	0,9	1
		MOSPILAN	23376	35-50 g/Hl	14	Máximo 2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días		
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					
	DELTAMETRIN	METEOR	25760	0,087%	30		0,04	S
		SCATTO	ES-00012	VER OBSERV.	30	1 aplicación. 0,05% para cochinillas y ceratitis. 0,03-0,05% pulgones y psilidos		
		DELTAGRI	ES-00013					
	MALTODEXTRIN	MAJESTIK	ES-00848	8 l/ha	NP	1 tratamiento. De BBCH 69-89	0,05	0,26
	PIRIPROXIFEN	ADMIRAL 10 EC	24439	0,025-0,05%	30	1 aplicación por campaña	0,6	0,5
		MULIGAN	24089	0,05-0,075%	30	1 sola aplicación		
		EXPEDIENT 10 EC	24252		30			
		ALAZIN	24314		30			
		PROXIMO	24542		30			
		BRAI	24635		30			
		JUVINAL 10 EC (*)	19675	0,05-0,075%	30	SOLO LIMÓN. 1 aplicación por campaña		
		ATOMINAL 10 EC (**)	19764		30	SOLO POMELO. 1 aplicación por campaña		
	SPIROTETRAMAT 10%	MOVENTO GOLD	ES-00024	0,045-0,075%	14	Máx. 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días sin sobrepasar 2,25 lt/ha y aplicación	0,5	0,6
	SPIROTETRAMAT 15%	MOVENTO 150 O-TEQ	25298	0,04-0,05%	14	2 aplicaciones por campaña. De BBCH 71-78	0,5	0,6

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Piojo rojo *de California (Aonidiella aurantii)*	ACEITE DE NARANJA	LIMOCIDE J	ES-01273	8 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89	-	-
		LIMOCIDE	ES-00674	8 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 54,6 %	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
		VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos		
		ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246					
		BENOIL NARANJOS	13073	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos. Máximo 2 aplic.		
		AGROACEITE BLANCO	14620					
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CITROLE	20036	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CEKUOIL-V83	17195					
		PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear		
		LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos		
		ESTIUOIL	ES-00290					
		INSECTOIL KEY	ES-00291					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVIPRON-TOP	ES-00079	20-30 l/ha	20	2-4 aplicaciones intervalos 7 días	-	-
		OVISPRAY	ES-00090	22,5-40	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 81,7 %	OVIPHYT	13557	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	LUQSOL PREMIUM BLUE	13074	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
		BELPROIL-A	13141					
		AGROACEITE	13659					
		AGROIL	22319					
		PROMANAL AGRO	ES-00053					
	ACETAMIPRID	CARNADINE	ES-00629	0,05-0,07 l/Hl	30	No aplicar durante periodo de floración. Máximo 2 aplicaciones	0,9	1
		MOSPILAN	23376	35-50 g/Hl	14	Máximo 2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días		
		EPIK	23377					
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Piojo rojo *de California (Aonidiella aurantii)*	DELTAMETRIN	METEOR	25760	0,087%	30		0,04	S
		SCATTO	ES-00012	VER OBSERV.	30	1 aplicación. 0,05% para cochinillas y ceratitis. 0,03-0,05% pulgones y psilidos		
		DELTAGRI	ES-00013					
	MALTODEXTRIN	MAJESTIK	ES-00848	8 l/ha	NP	1 tratamiento. De BBCH 69-89	0,05	0,26
	PIRIPROXIFEN	JUVINAL 10 EC	19675	0,05-0,075%	30	1 aplicación por campaña	0,6	0,5
		ATOMINAL 10 EC	19764					
		MULIGAN	24089					
		EXPEDIENT 10 EC	24252					
		ALAZIN	24314					
		ADMIRAL 10 EC	24439					
		PROXIMO	24542					
		BRAI	24635					
		HARPUN	ES-00769	2,25 l/ha	28	1 aplicación		
	RESCALURE	DARDO (VP)	ES-00169	400-600 difusores/ha	NP		exento	S
		CheckMate CRS	ES-01406	450 difusores/ha	NP			
	SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS	FLIPPER	ES-00249	1 l/Hl	NP	1-5 aplicaciones. De BBCH 10-89	exento	S
	SPIROTETRAMAT 10%	MOVENTO GOLD	ES-00024	0,045-0,075%	14	Máx. 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días sin sobrepasar 2,25 lt/ha y aplicación	0,5	0,6
	SPIROTETRAMAT 15%	MOVENTO 150 O-TEQ	25298	0,03-0,04%	14	2 aplicaciones por campaña. De BBCH 71-78	0,5	0,6

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Piojo gris *(Parlatoria pergandii)*	ACEITE DE NARANJA	LIMOCIDE J	ES-01273	8 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89	-	-
		LIMOCIDE	ES-00674	8 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 54,6 %	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 65,4 %	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos	-	-
		ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246					
		BENOIL NARANJOS	13073	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos. Máximo 2 aplicaciones		
		AGROACEITE BLANCO	14620					
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CITROLE	20036	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CEKUOIL-V83	17195					
		PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear		
		LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos		
		ESTIUOIL	ES-00290					
		INSECTOIL KEY	ES-00291					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVIPRON-TOP	ES-00079	20-30 l/ha	20	2-4 aplicaciones intervalos 7 días	-	-
		OVISPRAY	ES-00090	22,5-40 l/ha	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 81,7 %	OVIPHYT	13557	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	LUQSOL PREMIUM BLUE	13074	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
		BELPROIL-A	13141					
		AGROACEITE	13659					
		AGROIL	22319					
		PROMANAL AGRO	ES-00053					
	ACETAMIPRID	CARNADINE	ES-00629	0,05-0,07 l/Hl	30	No aplicar durante periodo de floración. Máximo 2 aplicaciones	0,9	1
		MOSPILAN	23376	35-50 g/Hl	14	Máximo 2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días		
		EPIK	23377					
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Piojo gris *(Parlatoria pergandii)*	DELTAMETRIN	METEOR	25760	0,087%	30		0,04	S
		SCATTO	ES-00012	VER OBSERV.	30	1 aplicación. 0,05% para cochinillas y ceratitis. 0,03-0,05% pulgones y psilidos		
		DELTAGRI	ES-00013					
	MALTODEXTRIN	MAJESTIK	ES-00848	8 l/ha	NP	1 tratamiento. De BBCH 69-89	0,05	0,26
	PIRIPROXIFEN	JUVINAL 10 EC	19675	0,05-0,075%	30	1 aplicación por campaña	0,6	0,5
		ATOMINAL 10 EC	19764					
		MULIGAN	24089					
		EXPEDIENT 10 EC	24252					
		ALAZIN	24314					
		ADMIRAL 10 EC	24439					
		PROXIMO	24542					
		BRAI	24635					
		HARPUN	ES-00769	2,25 l/ha	28	1 aplicación		
	SPIROTETRAMAT 10%	MOVENTO GOLD	ES-00024	0,045-0,075%	14	Máx. 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días sin sobrepasar 2,25 lt/ha y aplicación	0,5	0,6
	SPIROTETRAMAT 15%	MOVENTO 150 O-TEQ	25298	0,04-0,05%	14	2 aplicaciones por campaña. De BBCH 71-78	0,5	0,6

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Serpetas *(Cornuapsis beckii, Insulaspis gloverii)*	ACEITE DE NARANJA	LIMOCIDE J	ES-01273	8 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89	-	-
		LIMOCIDE	ES-00674	8 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 54,6 %	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 65,4 %	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos	-	-
		ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246					
		BENOIL NARANJOS	13073	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos. Máximo 2 aplicaciones		
		AGROACEITE BLANCO	14620					
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CITROLE	20036	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CEKUOIL-V83	17195					
		PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear		
		LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos		
		ESTIUOIL	ES-00290					
		INSECTOIL KEY	ES-00291					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVIPRON-TOP	ES-00079	20-30 l/ha	20	2-4 aplicaciones intervalos 7 días	-	-
		OVISPRAY	ES-00090	22,5-40 L/ha	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 81,7 %	OVIPHYT	13557	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	LUQSOL PREMIUM BLUE	13074	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
		BELPROIL-A	13141					
		AGROACEITE	13659					
		AGROIL	22319					
	ACETAMIPRID	CARNADINE	ES-00629	0,05-0,07 l/Hl	30	No aplicar durante periodo de floración. Máximo 2 aplicaciones	0,9	1
		MOSPILAN	23376	35-50 g/Hl	14	Máximo 2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días		
		EPIK	23377					
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					
	DELTAMETRIN	SCATTO	ES-00012	VER OBSERV.	30	1 aplicación. 0,05% para cochinillas y ceratitis. 0,03-0,05% pulgones y psilidos	0,04	S
		DELTAGRI	ES-00013					
	MALTODEXTRIN	MAJESTIK	ES-00848	8 l/ha	NP	1 tratamiento. De BBCH 69-89	0,05	0,26
	PIRIPROXIFEN	JUVINAL 10 EC	19675	0,025-0,05%	30	1 aplicación por campaña	0,6	0,5
		ATOMINAL 10 EC	19764					
		ADMIRAL 10 EC	24439					
		MULIGAN	24089					
		EXPEDIENT 10 EC	24252					
		ALAZIN	24314					
		PROXIMO	24542					
		BRAI	24635					
		HARPUN	ES-00769	2,25 l/ha	28	1 aplicación		
	SPIROTETRAMAT 10%	MOVENTO GOLD	ES-00024	0,045-0,075%	14	Máx. 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días sin sobrepasar 2,25 lt/ha y aplicación	0,5	0,6

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Caparreta *(Saissetia oleae)*	ACEITE DE NARANJA	LIMOCIDE J	ES-01273	8 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89	-	-
		LIMOCIDE	ES-00674	8 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 54,6 %	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 65,4 %	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos	-	-
		ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246					
		BENOIL NARANJOS	13073	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos. Máximo 2 aplicaciones		
		AGROACEITE BLANCO	14620					
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CITROLE	20036	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CEKUOIL-V83	17195					
		PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear		
		LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos		
		ESTIUOIL	ES-00290					
		INSECTOIL KEY	ES-00291					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVIPRON-TOP	ES-00079	20-30 l/ha	20	2-4 aplicaciones intervalos 7 días	-	-
		OVISPRAY	ES-00090	22,5-40 l/ha	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 81,7 %	OVIPHYT	13557	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	LUQSOL PREMIUM BLUE	13074	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
		BELPROIL-A	13141					
		AGROACEITE	13659					
		AGROIL	22319					
	ACETAMIPRID	CARNADINE	ES-00629	0,05-0,07 l/Hl	30	No aplicar durante periodo de floración. Máximo 2 aplicaciones	0,9	1
		MOSPILAN	23376	35-50 g/Hl	14	Máximo 2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días		
		EPIK	23377					
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	ALIGN	23291	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		FORTUNE AZA	24288					
		AZATIN	19660					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					
	DELTAMETRIN	DECIS EVO	25838	35-40 ml/100 l	30	1 aplicación	0,04	S
		SCATTO	ES-00012	VER OBSERV.	30	1 aplicación. 0,05% para cochinillas y ceratitis. 0,03-0,05% pulgones y psilidos		
		DELTAGRI	ES-00013					
	MALTODEXTRIN	MAJESTIK	ES-00848	8 l/ha	NP	1 tratamiento. De BBCH 69-89	0,05	0,26
	PIRIPROXIFEN	JUVINAL 10 EC	19675	0,025-0,05%	30	1 aplicación por campaña	0,6	0,5
		ATOMINAL 10 EC	19764					
		ADMIRAL 10 EC	24439					
		MULIGAN	24089					
		EXPEDIENT 10 EC	24252					
		ALAZIN	24314					
		PROXIMO	24542					
		BRAI	24635					
		HARPUN	ES-00769	2,25 l/ha	28	1 aplicación		
	SPIROTETRAMAT 10%	MOVENTO GOLD	ES-00024	0,045-0,075%	14	Máx. 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días sin sobrepasar 2,25 lt/ha y aplicación	0,5	0,6

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Cotonet *(Planococcus citri)*	ACEITE DE NARANJA	LIMOCIDE J	ES-01273	8 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89	-	-
		LIMOCIDE	ES-00674	8 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89		
		OROCIDE (*)	ES-00867	8 l/ha	NP	Solo LIMÓN. De BBCH 40-89. 1 aplicación		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 54,6 %	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 65,4 %	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos	-	-
		ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246					
		BENOIL NARANJOS	13073	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos. Máximo 2 aplicaciones		
		AGROACEITE BLANCO	14620					
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CITROLE	20036	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CEKUOIL-V83	17195					
		PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear		
		LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos		
		ESTIUOIL	ES-00290					
		INSECTOIL KEY	ES-00291					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVIPRON-TOP	ES-00079	20-30 l/ha	20	2-4 aplicaciones intervalos 7 días	-	-
		OVISPRAY	ES-00090	22,5-40	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 81,7 %	OVIPHYT	13557	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	LUQSOL PREMIUM BLUE	13074	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
		BELPROIL-A	13141					
		AGROACEITE	13659					
		AGROIL	22319					
	ACETAMIPRID	CARNADINE	ES-00629	0,05-0,07 l/Hl	30	No aplicar durante periodo de floración. Máximo 2 aplicaciones	0,9	1
		MOSPILAN	23376	35-50 g/Hl	14	Máximo 2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días		
		EPIK	23377					
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					
	DELTAMETRIN	SCATTO	ES-00012	VER OBSERV.	30	1 aplicación. 0,05% para cochinillas y ceratitis. 0,03-0,05% pulgones y psilidos	0,04	S
		DELTAGRI	ES-00013					
	MALTODEXTRIN	MAJESTIK	ES-00848	8 l/ha	NP	1 tratamiento. De BBCH 69-89	0,05	0,26
	PIRIPROXIFEN	MULIGAN	24089	0,05-0,075%	30	1 sola aplicación	0,6	0,5
	SPIROTETRAMAT 10%	MOVENTO GOLD	ES-00024	0,045-0,075%	14	Máx. 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días sin sobrepasar 2,25 lt/ha y aplicación	0,5	0,6
	SPIROTETRAMAT 15%	MOVENTO 150 O-TEQ	25298	0,03-0,05%	14	2 aplicaciones por campaña. De BBCH 71-78	0,5	0,6

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Otras cochinillas	ACEITE DE NARANJA	LIMOCIDE J	ES-01273	8 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89	-	-
		LIMOCIDE	ES-00674	8 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 54,6 %	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
		VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos		
		ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246					
		BENOIL NARANJOS	13073	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos. Máximo 2 aplicaciones		
		AGROACEITE BLANCO	14620					
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CITROLE	20036	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CEKUOIL-V83	17195					
		PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear		
		LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos		
		ESTIUOIL	ES-00290					
		INSECTOIL KEY	ES-00291					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVIPRON-TOP	ES-00079	20-30 l/ha	20	2-4 aplicaciones intervalos 7 días	-	-
		OVISPRAY	ES-00090	22,5-40 l/ha	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 81,7 %	OVIPHYT	13557	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	LUQSOL PREMIUM BLUE	13074	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
		BELPROIL-A	13141					
		AGROACEITE	13659					
		AGROIL	22319					
	ACETAMIPRID	CARNADINE	ES-00629	0,05-0,07 l/Hl	30	No aplicar durante periodo de floración. Máximo 2 aplicaciones	0,9	1
		MOSPILAN	23376	35-50 g/Hl	14	Máximo 2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días		
		EPIK	23377					
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					
	DELTAMETRIN	SCATTO	ES-00012	VER OBSERV.	30	1aplicación. 0,05% para cochinillas y ceratitis. 0,03-0,05% pulgones y psilidos	0,04	S
		DELTAGRI	ES-00013					
	MALTODEXTRIN	MAJESTIK	ES-00848	8 l/ha	NP	1 tratamiento. De BBCH 69-89	0,05	0,26
	PIRIPROXIFEN	MULIGAN	24089	0,05-0,075%	30	1 sola aplicación	0,6	0,5
	SPIROTETRAMAT 10%	MOVENTO GOLD	ES-00024	0,045-0,075%	14	Máx. 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días sin sobrepasar 2,25 lt/ha y aplicación	0,5	0,6

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Polilla del limonero *(Prays citri)*	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI	TUREX 50 WG (*)	ES-00045	1-2 Kg/ha	NP	Solo LIMÓN. 2-3 veces/año. Intervalo 7 días. BBCH 67-89	exenta	S
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351)	BACTUR 2X	19856	0,06-0,1%	NP	Máx 10 aplicaciones al año	exenta	S
		GEODA	21056					
		BAZTHU-32	23976					
		BIOMAX	25042	0,75-1 Kg/ha	NP	Máx 10 aplicaciones al año		
		DIPEL DF	23738	0,75-1 Kg/ha	NP	Máximo 10 aplicaciones/campaña. Intervalo 7-10 días desde eclosión de larvas		
		BIOBIT 32	24520					
		ESMALK	25342					
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA EG 2348)	RAPAX AS	ES-00282	1-2 l/ha	NP	1-3 aplicaciones a intervalos 7-10 días. BBCH <= 80. Dosis 0,067-0,33%	exenta	S
		CORDALENE	19848	1-2 l/ha	NP	Máx 3 aplicaciones al año. Hasta BBCH-80.		
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB-54)	PRESA 16	22954	0,06-0,18%	NA	Max 2 aplicaciones. Intervalos 7-14 días	exenta	S
		BIOSCROP BT 16	25258					
		LEPIBACK	25314					
		BELTHIRUL	22423	0,5-1 Kg/ha	NP	Max 2 aplicaciones. Intervalos 7-14 días		
		EPSILON	24096					
		BIOSCROP BT 32	25257					
		BELTHIRUL 16 SC	25313	1,5-3 l/ha	NP	Max 2 aplicaciones. Intervalos 7-14 días		
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-11)	DELFIN	19159	0,05-0,075%	NP	Máx 4 aplicaciones al año	exenta	S
		COSTAR	22060	50-100gr/100 litros	NP	Máx 4 aplicaciones al año		
	DELTAMETRIN	DECIS PROTECH	23545	0,05%	30	1 aplicación por campaña	0,04	S
		DELTAPLAN	13688	0,03-0,05%	30	1 aplicación. No sobrepasar 0,5l/ha		
		AUDACE	23188					
		DECIS	25100	0,03-0,05%	30	3 Aplicaciones. Intervalo mínimo 14 días. No más de 0,5 l/ha de producto por aplicación.		
	TAU-FLUVALINATO	MAVRIK	16417	0,01%	30	1 aplicación	0,4	S
		KLARTAN 24 AF	18498					
		KLARTAN EW	23858					
Cacoecia *(Cacoecimorpha pronubana)*	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA EG 2348)	LAPINOX PLUS (**)	ES-00082	0,75-1 Kg/ha	NP	Solo POMELO. Hasta BBCH 80. Máximo 3 a intervalos 7-10 días	exenta	S
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351)	BACTUR 2X	19856	0,06-0,1%	NP	Máx 10 aplicaciones al año	exenta	S
		GEODA	21056					
		BAZTHU-32	23976	0,06-0,1%	NP	Max. 10 aplicaciones. Intervalos 3-10 días desde eclosión larvas		
		BIOBIT 32	24520	0,75-1 Kg/ha	NP	Máximo 10 aplicaciones/campaña. Intervalo 7-10 días desde eclosión de larvas		
		BIOMAX	25042	0,75-1 Kg/ha	NP	Máx 10 aplicaciones al año		
		DIPEL DF	23738	0,75-1 Kg/ha	NP	Máximo 10 aplicaciones/campaña. Intervalo 7-10 días desde eclosión de larvas		
		ESMALK	25342					
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB-54)	BELTHIRUL	22423	0,5-1 Kg/ha	NP	Max 2 aplicaciones. Intervalos 7-14 días	exenta	S
		EPSILON	24096					
		BIOSCROP BT 32	25257					
		BELTHIRUL 16 SC	25313	1,5-3 l/ha	NP	Max 2 aplicaciones. Intervalos 7-14 días		
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-11)	DELFIN	19159	0,05-0,075%	NP	Máx 4 aplicaciones al año	exenta	S
	DELTAMETRIN	AUDACE	23188	0,03-0,05%	30	1 aplicación. No sobrepasar 0,5l/ha	0,04	S

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Mosca de la fruta *(Ceratitis capitata)*	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA		
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CITROLE	20036	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CEKUOIL-V83	17195					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña		
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					
	BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040)	NATURALIS	20111	125 ml/Hl	NP	3-5 aplicaciones intervalos 5-7 días. 1-2 l/ha	exenta	S
	CYANTRANILIPROL 10% [SE] P/V	EXIREL CEBO	ES-01432	100 ml/ha	1	Máximo 3 aplicaciónes CEBO DE BBCH 81-89	0,9	0,7
	DELTAMETRIN	METEOR	25760	0,087%	30		0,04	S
		DECIS EVO	25838	35-40 ml/100 l	30	1 aplicación		
		SCATTO	ES-00012	VER OBSERV.	30	1aplicación. 0,05% para cochinillas y ceratitis. 0,03-0,05% pulgones y psilidos		
		DELTAGRI	ES-00013					
	DELTAMETRIN trampa	RAFAGA TRAP	ES-01246	50-80 trampas/ha	NP	De BBCH 70 a cosecha	0,04	S
		DELMUR TRAP	ES-01182	50-80 trampas/ha	NP			
	ESFENVALERATO	MOSKISAN	ES-01467	50 trampas/ha	NP	De BBCH71 hasta madurez	0,02*	S
		KENOTRAP COMPLET	ES-01398	50 trampas/ha	NP			
	ETOFENPROX	TREBON	18427	0,10%	7	En pulverización cebo	1,5	5
		SHARK	23333	0,10%	7	Máximo 4 aplicaciones		
	LAMBDA CIHALOTRIN (TRAMPA)	CONETRAP CERATITIS	ES-00624	40-80 trampas/ ha	NP	Duración protección 120 días	0,2	S
	LAMBDA-CIHALOTRIN	POINTER 100 CS	25624	0,01-0,02%	7	1 aplicación por campaña.	0,2	S
		KÁRATE ZEÓN	22398	0,01-0,02%	7	Sólo pulverización cebo		
		KENDO	24942					
		KARATE ZEON + 1.5 CS	25143	0,065-0,13%	7	1 aplicación por campaña		
		LAMDEX EXTRA	17091	0,4-0,5%	7	Sólo pulverización cebo		
		LAMDEX 2.5WG	24928					
		LAMDEX EXTRA N	25357					
	PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 30%	BIOCEBO	22270	1,5%	* Ver ficha	Se pueden aplicar en mezcla con insecticidas específicos autorizados para el control de mosca de la fruta	exento	S
		PROTEINAS HIDROLIZADAS LIFE	14634	1,5%	NP	Se pueden aplicar en mezcla con insecticidas específicos autorizados para el control de mosca de la fruta. Max. 3 aplicaciones		
		ATTRACK	24150	0,6-0,68%	* Ver ficha	Máx. 3 aplicaciones. Desde BBCH 71-89		
		NUTREL	24484	1,5-2,4 l/ha	* Ver ficha	Se pueden aplicar en mezcla con insecticidas específicos autorizados para el control de mosca de la fruta		
	PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 36%	FLYRAL	24630	1,25%	NA	Se pueden aplicar en mezcla con insecticidas específicos autorizados para el control de mosca de la fruta	exento	S
	PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 5,9%	CERA-TRAP	24937	48-60 l/ha	NP	1 aplicación	exento	S
	SISTEMAS DE CAPTURA MASIVA O ATRACCIÓN Y MUERTE	MAGNET MED	25520	50-75 uds/ha	NP		exento	S
		DECIS TRAP	ES-00041	50-80 uds/ha	NP	1 aplicación		
		CERATIPACK	ES-00042					
	SPINOSAD	SPINTOR-CEBO	23808	Según aplicación	1	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA	0,3	0,3

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Mosca Blanca (*Aleurothrixus floccosus*)	ACEITE DE NARANJA	PREVAM (**)	25761	6 l/ha	NP	Solo POMELO. De BBCH 71-79	-	-
		LIMOCIDE J	ES-01273	8 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 40-89		
		LIMOCIDE	ES-00674	8 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89		
		OROCIDE (*)	ES-00867	8 l/ha	NP	Solo LIMÓN. De BBCH 40-89. 1 aplicación		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 65,4 %	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos	-	-
		ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246					
		BENOIL NARANJOS	13073	1-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos. Máximo 2 aplicaciones		
		AGROACEITE BLANCO	14620					
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA	-	-
		BLAFIL	13848					
		FULMIT OLEO L.E	11807	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA		
		IVENOL MASSÓ	13847					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CITROLE	20036	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CEKUOIL-V83	17195					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVISPRAY	ES-00090	10-30 l/ha	NP	Forma y época de aplicación en FICHA	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 81,7 %	OVIPHYT	13557	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	LUQSOL PREMIUM BLUE	13074	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
		BELPROIL-A	13141					
		AGROACEITE	13659					
		AGROIL	22319					
		PROMANAL AGRO	ES-00053					
	ACETAMIPRID	MOSPILAN	23376	35-50 g/Hl	14	Máximo 2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días	0,9	1
		EPIK	23377					
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7	Máximo 1-2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días	0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					
	DELTAMETRIN	METEOR	25760	0,087%	30		0,04	S
		DECIS EVO	25838	35-40 ml/100 l	30	1 aplicación		
	PIRETRINAS 4,65%	CORDIAL EXTRA	ES-00543	0,96 l/ha	1	3 aplicaciones. Intervalos 7 días. Aplicar al comienzo de la plaga	1	S
	PIRIDABEN 10%	SANMITE 10 SC	ES-00114	3 l/ha	14	De BBCH 69-83	LIMÓN 0,3 POMELO 0,5	0,9
	SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS	FLIPPER	ES-00249	1 l/Hl	NP	1-5 aplicaciones. De BBCH 10-89	exento	S
	SPIROTETRAMAT 10%	MOVENTO GOLD	ES-00024	0,045-0,075%	14	Máx. 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días sin sobrepasar 2,25 lt/ha y aplicación	0,5	0,6
	SPIROTETRAMAT 15%	MOVENTO 150 O-TEQ	25298	0,03-0,05%	14	2 aplicaciones por campaña. De BBCH 71-78	0,5	0,6

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Mosquito verde (*Empoasca spp.*)	ACEITE DE NARANJA	LIMOCIDE J	ES-01273	8 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 40-89	-	-
		LIMOCIDE	ES-00674	8 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89		
		OROCIDE (*)	ES-00867	8 l/ha	NP	Solo LIMÓN. De BBCH 40-89. 1 aplicación		
		PREVAM (**)	25761	8 l/ha	NP	Solo POMELO. Máximo 6 aplicaiciones. Intervalo mínimo 10 días.		
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					
	CAOLIN 99% [WP] P/P	ARGICAL PRO	ES-01537	50 Kg/ha	1	De BBCH 81-89	exenta	S
	FENPIROXIMATO	FLASH UM	19241	0,10%	14	1 aplicación. Dosis máxima 1-2 l/ha	0,5	1
	LAMBDA CIHALOTRIN	LAMBDASTAR	25882	VER OBSERV.	7	0,075 l/ha pulgones. 0,11 l/ha cicadélidos y orugas. 3 aplicaciones por campaña	0,2	S

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Pulgones *(Aphis spiraecola, Aphis gossypii, Aphis craccivora, Myzus persicae, Microshiphum euphorbiae, Toxoptera aurantii)*	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 65,4 %	VOLCK VERANO	12033	0,75-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CEKUOIL-V83	17195	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CITROLE	20036					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVISPRAY	ES-00090	22,5 l/ha	NP	Forma y época de aplicación en FICHA	-	-
		LUQSOL PREMIUM BLUE	13074	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones		
		AGROACEITE	13659					
		AGROIL	22319					
	ACETAMIPRID	ACEMUR	ES-00656	0,025%	No aplicar después del	Aplicar como máximo a 500 g/ha. Aplicar desde que empieza a crecer el brote (BBCH 31-72)	0,9	1
		CORNALINA	ES-00657					
		CARNADINE	ES-00629	0,025 l/Hl	14	Aplicar durante BBCH 71-89. No aplicar en floración. Máximo 2 aplicaciones		
		GAZEL PLUS SG	25393	25 g/Hl	14	Tratar a comienzo de primavera, de crecimiento de brotes hasta caída de pétalos.		
		MOSPILAN	23376	35 g/Hl	14	Máximo 2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días		
		EPIK	23377					
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					
	DELTAMETRIN	DECIS PROTECH	23545	0,05%	30	1 aplicación por campaña	0,04	S
		METEOR	25760	0,087%	30			
		DELTAPLAN	13688	0,03-0,05%	30	1 aplicación. No sobrepasar 0,5l/ha		
		AUDACE	23188					
		DECIS	25100	0,03-0,05%	30	No más de 0,5 l/ha de producto por aplicación.		
		DECIS EXPERT	23782	0,075-0,125%	30	1 aplicación por campaña		
		DECIS EVO	25838	35-40 ml/100 l	30	1 aplicación		
		SCATTO	ES-00012	VER OBSERV.	30	1aplicación. 0,05% para cochinillas y ceratitis. 0,03-0,05% pulgones y psilidos		
		DELTAGRI	ES-00013					
	FLONICAMID	TEPPEKI	24526	5 g/Hl	60	Máx 2 aplicaciones por año.	0,15	1,5
	LAMBDA-CIHALOTRIN	KENDO	24942	0,01-0,02%	7	1 aplicación por campaña.	0,2	S
		POINTER 100 CS	25624					
		KÁRATE ZEÓN	22398	0,01-0,02%	7			
		LAMDEX 2.5WG (**)	24928	0,04-0,08%	7	Solo POMELO.		
		LAMDEX EXTRA N (**)	25357					
		KARATE ZEON + 1.5 CS	25143	0,065-0,13%	7	1 aplicación por campaña		
		LAMBDASTAR	25882	VER OBSERV.	7	0,075 l/ha pulgones. 0,11 l/ha cicadélidos y orugas. 3 aplicaciones por campaña		
	PIRETRINAS 12,9 G/L	PYGANIC	ES-00237	2,25 l/ha	7	2 aplicacionts, Intervalo 4-6 días. BBCH 55-75	1	S
	PIRETRINAS 4,65%	CORDIAL EXTRA	ES-00543	0,96 l/ha	1	3 aplicaciones. Intervalos 7 días. Aplicar al comienzo de la plaga	1	S
	SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS	FLIPPER	ES-00249	1 l/Hl	NP	1-5 aplicaciones. De BBCH 10-89	exento	S
	SPIROTETRAMAT 10%	MOVENTO GOLD	ES-00024	0,045-0,06%	14	Máx. 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días sin sobrepasar 2,25 lt/ha y aplicación	0,5	0,6
	SPIROTETRAMAT 15%	MOVENTO 150 O-TEQ	25298	0,03-0,04%	14	2 aplicaciones por campaña. De BBCH 71-78	0,5	0,6
	TAU-FLUVALINATO	MAVRIK	16417	0,01%	30	1 aplicación	0,4	S
		KLARTAN 24 AF	18498					
		KLARTAN EW	23858					

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Minador *(Phyllocnistis citrella)*	ACETAMIPRID	CARNADINE	ES-00629	0,035-0,05 l/Hl	14	Aplicar durante BBCH 71-89. No aplicar durante el periodo de floración de los cultivos. Máximo 2 aplicaciones	0,9	1
		GAZEL PLUS SG	25393	25 g/Hl	14	Tratar a comienzo de primavera, desde el crecimiento de brotes hasta caída de pétalos. Vol. max caldo de 2.000 l/Ha.		
		MOSPILAN	23376	35-50 g/Hl	14	Máximo 2 tratamientos con un máximo de 500 g/Ha. espaciados 30 días		
		EPIK	23377					
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	2,6 ml/árbol	7	Sólo en plantones hasta 3 años.	0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		AZAFIT	25035					
		ZAFIRO	25034					
		ZENITH	24676	0,075%	7	En plantones e injertadas, sólo pintado al tronco. Tratar al aparecer la infestacion		
		AZAR	24816					
		OIKOS	24313	0,075%	7	Plantones de menos de 3 años, pintando el tronco. Tratar al aparecer la infestacion		
		ZENITH A26	24736	0,075%	7	Sólo en plantones e injertadas. Sólo pintado al tronco. Tratar al aparecer la infestacion		
		ALIGN	23291	0,075%	7	Sólo en plantones hasta 3 años. Tratar al aparecer la infestacion. Máximo 2 aplicaciones		
		FORTUNE AZA	24288	75 ml/100 litros	7	1 aplicación. En plantones de menos de 3 años, pintando el tronco		
	CLORANTRANILIPROL	CORAGEN 20 SC	25334	0,05 l/ha	NP	2 aplicaciones. Solo en plantones sin producción de cosecha	0,5	1,4
	LAMBDA-CIHALOTRIN	KÁRATE ZEÓN	22398	0,01-0,02%	7		0,2	S
	TEBUFENOCIDA	MIMIC	19984	0,06 - 0,075 l/Hl	14	Aplicar sobre brotes en crecimiento al inicio del ataque	2	2
Trips (*Frankiniella occidentalis, Heliothrips haemorrhoidalis, Pezothrips kellyanus*)	ACEITE DE NARANJA	LIMOCIDE J	ES-01273	8 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89	-	-
		LIMOCIDE	ES-00674	8 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70- 89		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA		
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CITROLE	20036	1-2 l/100 l	NP	Forma, dosis y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CEKUOIL-V83	17195					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	AZADIRACTIN 1%	ADINA	22166	1,95 l/ha	7		0,5	S
	AZADIRACTIN 2,6%	AZATIN	19660	0,075%	7	1 aplicación por campaña	0,5	S
		ALIGN	23291					
		FORTUNE AZA	24288					
		OIKOS	24313					
		ZENITH	24676					
		ZENITH A26	24736					
		AZAR	24816					
		ZAFIRO	25034					
		AZAFIT	25035					
	ETOFENPROX	SHARK	23333	0,1%	7	Máximo 4 aplicaciones	1,5	5
		TREBON	18427	0,10%	7			
	SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS	FLIPPER	ES-00249	1 l/Hl	NP	1-5 aplicaciones. De BBCH 10-89	exento	S
	SPIROTETRAMAT 10%	MOVENTO GOLD	ES-00024	0,06-0,075%	14	Máx. 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días sin sobrepasar 2,25 lt/ha y aplicación	0,5	0,6
	TAU-FLUVALINATO	MAVRIK	16417	0,01%	30	1 aplicación	0,4	S
		KLARTAN 24 AF	18498					
		KLARTAN EW	23858					

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Ácaro rojo *(Panonychus citri)*	ACEITE DE NARANJA	PREV-GOLD	ES-01274	4-7 l/ha	NP	2-3 aplicaciones. De BBCH 31-78	-	-
		LIMOCIDE J	ES-01273	6 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89		
		LIMOCIDE	ES-00674	6 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70- 89		
		OROCIDE (*)	ES-00867	6 l/ha	NP	Solo LIMÓN. De BBCH 40-89. 2 aplicaciones		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 65,4 %	VOLCK VERANO	12033	0,75-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CEKUOIL-V83	17195	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CITROLE	20036					
		PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear		
		LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos		
		ESTIUOIL	ES-00290					
		INSECTOIL KEY	ES-00291					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVIPRON-TOP	ES-00079	20-30 l/ha	20	2-4 aplicaciones intervalos 7 días	-	-
		OVISPRAY	ES-00090	22,5 l/ha	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	BELPROIL-A	13141	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA)	BOTANIGARD	22648	100-150 ml/Hl	NP	3-4 aplicaciones. Intervalos 5-7 días. Máx. 3 l/ha BBCH 10-89	exenta	S
	BIFENAZATO 48%	ACRAMITE 480SC	25590	0,6 l/ha	16	De BBCH 51 a 89. Fin venta 01/01/2023 y fin uso 01/01/2024	0,9	S
	CLOFENTEZIN	ACARISTOP	17021	0,01-0,02%	21	Máximo 1 aplicación al año	0,5	S
		CLOFENTEZIN 50SC	23630					
		APOLO 50 SC	24611					
	FENPIROXIMATO	FLASH UM	19241	0,1%	14	Una única aplicación a dosis de 1-2 l/ha y un volumen de caldo 1000-2000 l/ha. No se puede aplicar en cultivos altos con riesgo de deriva	0,5	1
	FENPIROXIMATO + HEXITIAZOX	AWARD (*)	ES-00892	1,2 l/ha	14	Solo LIMÓN. 1 aplicación. BBCH 65-83	0,5+0,5	1+0,6
	HEXITIAZOX	ACRUX	23489	0,01-0,015%	14	Una única aplicación	0,5	0,6
		JALISCO	23619					
		SHOSHI	23734					
		PERFIL	24206					
		DIABLO	24299					
		SHOSHI 25SC	ES-01114	0,04-0,15 l/ha	14	1 aplicación. De BBCH 00-97		
		NISSORUN FLOW (*)	ES-00116	0,32 l/ha	14	Solo LIMÓN. 3 aplicaciones		
		EXITOX	24401	0,8 Kg/ha	14	Máx. 3 aplicaciones. De BBCH 55 a BBCH 83		
		NISSORUM	24383					
		DIABLO MAX	ES-00233	4-6 ml/Hl	14	1 aplicación		
		TIAZOSAC	ES-00234					
		JALISCO SC	ES-00235					
	HEXITIAZOX + ABAMECTINA	ROCINANTE	ES-00659	0,75 l/ha	14	Fin venta 01/10/2023 y fin uso 01/04/2024	0,5 + 0,04	0,6 + 0,02
		CROCHET	ES-00660					
	PIRIDABEN 10%	SANMITE 10 SC	ES-00114	3 l/ha	14	De BBCH 69-83	LIMÓN 0,3 POMELO 0,5	0,9
	SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS	FLIPPER	ES-00249	1 l/Hl	NP	1-5 aplicaciones. De BBCH 10-89	exento	S

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Araña amarilla *(Tetranychus urticae)*	ACEITE DE NARANJA	PREV-GOLD	ES-01274	4-7 l/ha	NP	2-3 aplicaciones. De BBCH 31-78	-	-
		LIMOCIDE J	ES-01273	6 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89		
		LIMOCIDE	ES-00674	6 l/ha	1	De BBCH 70- 89		
		OROCIDE (*)	ES-00867	6 l/ha	NP	Solo LIMÓN. De BBCH 40-89. 2 aplicaciones		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 65,4 %	VOLCK VERANO	12033	0,75-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CEKUOIL-V83	17195	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CITROLE	20036					
		PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear		
		LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos		
		ESTIUOIL	ES-00290					
		INSECTOIL KEY	ES-00291					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	VER FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVIPRON-TOP	ES-00079	20-30 l/ha	20	2-4 aplicaciones intervalos 7 días	-	-
		OVISPRAY	ES-00090	22,5 l/ha	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	BELPROIL-A	13141	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA)	BOTANIGARD	22648	100-150 ml/Hl	NP	3-4 aplicaciones. Intervalos 5-7 días. Máx. 3 l/ha BBCH 10-89	exenta	S
	BIFENAZATO 48%	ACRAMITE 480SC	25590	0,6 l/ha	16	De BBCH 51 a 89. Fin venta 01/01/2023 y fin uso 01/01/2024	0,9	S
	CLOFENTEZIN	ACARISTOP	17021	0,01-0,02%	21	Máximo 1 aplicación al año	0,5	S
		CLOFENTEZIN 50SC	23630					
		APOLO 50 SC	24611					
	FENPIROXIMATO	FLASH UM	19241	0,1%	14	1 aplicación. 1-2 l/ha	0,5	1
	FENPIROXIMATO + HEXITIAZOX	AWARD (*)	ES-00892	1,2 l/ha	14	Solo LIMÓN. 1 aplicación. BBCH 65-83	0,5+0,5	1+0,6
	HEXITIAZOX	ACRUX	23489	0,01-0,015%	14	Una única aplicación	0,5	0,6
		JALISCO	23619					
		SHOSHI	23734					
		PERFIL	24206					
		DIABLO	24299					
		SHOSHI 25SC	ES-01114	0,04-0,15 l/ha	14	1 aplicación. De BBCH 00-97		
		NISSORUN FLOW (*)	ES-00116	0,32 l/ha	14	Solo LIMÓN. 3 aplicaciones		
		EXITOX	24401	0,8 Kg/ha	14	Máx. 3 aplicaciones. De BBCH 55 a BBCH 83		
		NISSORUM	24383					
		DIABLO MAX	ES-00233	4-6 ml/Hl	14	1 aplicación		
		TIAZOSAC	ES-00234					
		JALISCO SC	ES-00235					
	HEXITIAZOX + ABAMECTINA	ROCINANTE	ES-00659	0,75 l/ha	14	Fin venta 01/10/2023 y fin uso 01/04/2024	0,5 + 0,04	0,6 + 0,02
		CROCHET	ES-00660					
	PIRIDABEN 10%	SANMITE 10 SC	ES-00114	3 l/ha	14	De BBCH 69-83	LIMÓN 0,3 POMELO 0,5	0,9
	SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS	FLIPPER	ES-00249	1 l/Hl	NP	1-5 aplicaciones. De BBCH 10-89	exento	S

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Ácaro Oriental *(Eutretranychus orientalis)*	ACEITE DE NARANJA	PREV-GOLD	ES-01274	4-7 l/ha	NP	2-3 aplicaciones. De BBCH 31-78	-	-
		LIMOCIDE J	ES-01273	6 l/ha	1	1 aplicación de BBCH 70-89		
		LIMOCIDE	ES-00674	6 l/ha	1	Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70- 89		
		OROCIDE (*)	ES-00867	6 l/ha	NP	Solo LIMÓN. De BBCH 40-89. 2 aplicaciones		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 65,4 %	VOLCK VERANO	12033	0,75-1,5%	NP	Tratar en primavera-verano, antes del cambio de coloración de frutos	-	-
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	EVER TRANSPARENTE	11485	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA	-	-
		FULMIT OLEO L.E	11807					
		IVENOL MASSÓ	13847					
		BLAFIL	13848					
		CITROL-INA	15173					
		OVIPRON	16192					
		CEKUOIL-V83	17195	1-1,5 l/100 l	NP	Forma y época de aplicación en FICHA. Máximo 4 aplicaciones		
		CITROLE	20036					
		PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear		
		LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos		
		ESTIUOIL	ES-00290					
		INSECTOIL KEY	ES-00291					
		CITROLE FORTE	ES-01101	Según plaga	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 80 %	OVIPRON-TOP	ES-00079	20-30 l/ha	20	2-4 aplicaciones intervalos 7 días	-	-
		OVISPRAY	ES-00090	22,5 l/ha	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 83 %	BELPROIL-A	13141	1-1,5%	NP	Tratar antes del cambio de color de los frutos. Máximo 2 aplicaciones	-	-
	BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA)	BOTANIGARD	22648	100-150 ml/Hl	NP	3-4 aplicaciones. Intervalos 5-7 días. Máx. 3 l/ha BBCH 10-89	exenta	S
	CLOFENTEZIN	ACARISTOP	17021	0,01-0,02%	21	Máximo 1 aplicación al año	0,5	S
		CLOFENTEZIN 50SC	23630					
		APOLO 50 SC	24611					
	FENPIROXIMATO	FLASH UM	19241	0,10%	14	1 aplicación. 1-2 l/ha	0,5	1
	FENPIROXIMATO + HEXITIAZOX	AWARD (*)	ES-00892	1,2 l/ha	14	Solo LIMÓN. 1 aplicación. BBCH 65-83	0,5+0,5	1+0,6
	HEXITIAZOX	ACRUX	23489	0,01-0,015%	14	1 aplicación por campaña	0,5	0,6
		JALISCO	23619					
		SHOSHI	23734					
		PERFIL	24206					
		DIABLO	24299					
		SHOSHI 25SC	ES-01114	0,04-0,15 l/ha	14	1 aplicación. De BBCH 00-97		
		NISSORUN FLOW (*)	ES-00116	0,32 l/ha	14	Solo LIMÓN. 3 aplicaciones		
		EXITOX	24401	0,8 Kg/ha	14	Máx. 3 aplicaciones. De BBCH 55 a BBCH 83		
		NISSORUM	24383					
		DIABLO MAX	ES-00233	4-6 ml/Hl	14	1 aplicación		
		TIAZOSAC	ES-00234					
		JALISCO SC	ES-00235					
	HEXITIAZOX + ABAMECTINA	ROCINANTE	ES-00659	0,75 l/ha	14	Fin venta 01/10/2023 y fin uso 01/04/2024	0,5 + 0,04	0,6 + 0,02
		CROCHET	ES-00660					
	PIRIDABEN 10%	SANMITE 10 SC	ES-00114	3 l/ha	14	De BBCH 69-83	LIMÓN 0,3 POMELO 0,5	0,9
	SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS	FLIPPER	ES-00249	1 l/Hl	NP	1-5 aplicaciones. De BBCH 10-89	exento	S

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. PLAGAS

PLAGA	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Ácaro de las maravillas (*Aceria sheldoni*)	ACEITE PARAFÍNICO FORMULADO AL 79 %	PLANTOIL PRO	ES-01352	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear	-	-
	AZUFRE 80 %	AZUMO MG (*)	24136	0,2 - 0,25%	NP	Solo LIMÓN. Máximo 6 aplicaciones.	exenta	S
		MICROCROPS ESPECIAL WG (*)	24370					
Caracoles y babosas (*Theba pisana, Helix aspersa, Otala lactea, Arion ater)*	FOSFATO FÉRRICO	NATUREN LIMEX	ES-01140	3 gr/m2	3	4 aplicaciones intervalos 10 días. De marzo a septiembre. Especies vegetales	exento	S
		IRONMAX PRO	ES-01169	7 Kg/ha	3	1-4 aplicaciones. Especies vegetales		
		SLUXX HP	ES-00327	7 kg/ha	NP	Leñosas. Máximo 4 aplicaciones por campaña		
		MINIXX	ES-01228	7 Kg/ha	NP			
	METALDEHIDO 1,5%	ECOMETAL (*)	ES-01102	7 Kg/ha	NP	Solo LIMÓN. 2-6 aplicaciones. De BBCH 00-69	0,05*	0,26
	METALDEHIDO 1% + FOSFATO FÉRRICO	METAREX DUO	ES-01172	5 kg/ha	7	Aplicar de reposo de yemas hasta maduración	0,05* + exento	0,26+ S
	METALDEHIDO 2,5% GB	ELIREX ONE	ES-01159	5 kg/ha	NP	Aplicación únicamente en cebo al suelo. 1-4 aplicaciones	0,05*	0,26
		METAREX M	ES-00047	5 kg/ha	NP	Aplicar en suelo antes caída de pétalos		
	METALDEHIDO 3% GB	LIMAGRAM	13037	7 kg/ha	7	Máximo 2 aplicaciones	0,05*	0,26
		LIMAGRAM-I	14411	7 Kg/ha	7	Máximo 3 aplicaciones. Intervalo 14 días		
		METASH 3%	ES-00118	7 kg/ha	NP	De BBCH 00-69. Máximo 3 aplicaciones		
	METALDEHIDO 4% GB	METAREX INOV	ES-00046	5 kg/ha	NP	Aplicar en suelo antes caída de pétalos	0,05*	0,26
		ANTI-LIMACOS DIRECTO PLUS	ES-00048	5 kg/ha	NP	Aplicar en suelo antes caída de pétalos		
	METALDEHIDO 5% GB	CARAQUIM	13174	7 kg/ha	20	Aplicación únicamente en cebo al suelo. Máximo 2 aplicaciones	0,05*	0,26
		METENAL	12469	7 kg/ha	20	Maximo 2 aplicaciones		
		METALIXON	12470					
		BABOSIL GRANULADO	12812					
		MULLO	22870	7 Kg/ha	NP	Máximo 2 aplicaciones. De BBCH 0-69		

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. ENFERMEDADES

ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Aguado *(Phytophthora spp.)*	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS subesp. plantarum (cepa D747)	VALCURE (**)	ES-00866	2,5 l/ha	NP	Solo POMELO. 8 aplicaciones. Aplicación riego por goteo. Hasta BBCH 89	exenta	S
	FOSETIL-AL	FESIL WG	18795	0,25-0,3%	14	Por lo general, dosis máxima 9 Kg/ ha. Máximo 3 aplicaciones por campaña e intervalo entre aplicaciones 60 días. En riego por goteo: 1-25 gr/árbol en función del tamaño de la copa. Máximo 10K/ha y 2 aplicaciones por campaña.	LIMÓN 150 POMELO 75	9
		DINAPIC	24926	0,25-0,3%	15	Dosis máxima 6 Kg/ ha. Máximo 4 aplicaciones.		
		POMBAL 80 WG	25505	0,25-0,3%	15	Máximo 3 aplicaciones por campaña		
		MAESTRO 80 WG	25724	0,25-0,3%	15			
		KATANGA WP	22730	0,25-0,3%	15	Máximo 3 aplicaciones por campaña e intervalo entre aplicaciones 30-150 días.		
		KATANGA EXPRESS	23711	0,25-0,3%	15	Máximo 3 aplicaciones por campaña. Ver ficha		
		ALIETTE WG	15907	0,25-0,3%	15	Por lo general, dosis máxima 9 Kg/ ha. Máximo 3 aplicaciones por campaña e intervalo entre aplicaciones 60 días. En riego por goteo: 1-25 gr/árbol en función del tamaño de la copa. Máximo 10K/ha y 2 aplicaciones por campaña.		
		ALIAL 80 WG	25501	0,25-0,45%	15	Máximo 3 aplicaciones por campaña e intervalo entre 10-14 días		
		FOSBEL 80 WG	25502	0,3-0,4%	14	Máximo 3 aplicaciones por campaña		
		FOSBEL 80 PM	20032	250-300 g/Hl	15	Máximo 3 aplicaciones por campaña e intervalo entre aplicaciones 90-120 días.		
		ALFIL	21650					
		POMBAL	22875					
		CARFAL WG	23788	250-300 g/Hl	15	Máximo 3 aplicaciones por campaña.		
		ALIAL	24207					
		KILATE	ES-00541	6 Kg/ha	14	1 aplicación. BBCH 37-81		
		KEYFOL WG	ES-00761					
		GOLBEX WG	ES-00760					
		OPTIX DISPERSS	ES-00504	6 Kg/ha	14	Máx. 4 aplicaciones. 2 en primavera y 2 en otoño. Aplicar con tamaño total de hojas		
		ALFIL WG	25504	ver ficha	14	Condiciones de aplicación en ficha		
	FOSFONATO POTASICO	MIKONOS	ES-01462	1,5-8,75 l/ha	15	Desde BBCH 40	0,01	S
		CUNEB (**)	ES-00302	1,5-8,75 l/ha	15	Solo POMELO. 2 aplicaciones. Intervalos de 20 días. BBCH>40.		
		PHYTORSARCAN (**)	ES-00303					
		FOSIKA (**)	ES-00304					
		LBG-01F34	25498	300-400 ml/Hl	15 pomelo 24 limón	De BBCH 79-89. Máximo 2 aplicaciones		
	HIDROXIDO CUPRICO 13,6% + OXICLORURO DE COBRE 13,6%	AIRONE	24949	0,2-0,4%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis, fomopsis. (Máximo 2 aplicaciones)	20	S
		AIRONE SC BLUE	24950					
		GRIFON	24951					
	HIDROXIDO CUPRICO 35%	KDOS	22002	0,15-0,2%	21	Aguado, Gomosis (aplicar desde cuajado hasta fruto maduro apto consumo)	20	S
		FUNGURAN-OH 50 PM	19709	1,3-1,8 Kg/ha	14	Tizón, aguado, gomosis (desde fruto empieza a colorear hasta maduración avanzada). Máximo 3 aplicaciones		
	HIDROXIDO CUPRICO 50%	HIDROCUPER-50	ES-01018	0,8 Kg/ha	15	De BBCH 81-89	20	S
		DROXICUPER-50	ES-01017	según enfermedad	15	Aplicar hasta 1.5 m de altura. Bacteriosis (1.5 Kg/ha), Hongos endofitos (1.5 Kg/ha), Aguado (0.6-0.8 Kg/ha), Fomopsis (1.5 Kg/ha)		
	METALAXIL	ARMETIL 25 WP (**)	25330	VER OBSERV.	14	Solo POMELO. De BBCH 19-85. Pulverización 0,8 Kg/ha. Max. 3 aplicaciones cada 14 días. En riego por goteo 1,52 Kg/ha en 1 aplicación	LIMÓN 0,5 POMELO 0,7	S
	OXICLORURO DE COBRE 14% + HIDROXIDO CUPRICO 14%	CUPRANTOL DUO	ES-00863	3,5 Kg/ha	14	Aplicar durante BBCH 73-PS	20	S
	OXICLORURO DE COBRE 25%	COPREN 25% HiBio	ES-01076	3-4 Kg/ha	14	Alternaria, pseudomonas. De BBCH 15-89	20	S
	OXICLORURO DE COBRE 30%	OSSIRAME 30 WP	24802	0,20%	14	Aguado. 3 aplicaciones por campaña a una altura máxima de 1.5m	20	S
	OXICLORURO DE COBRE 35%	OSSIRAME 35WG	25153	0,23-0,28%	14	Máximo 4 aplicaciones. Intervalos 12-14 días. De BBCH 15-89. Máx. 2,3-2,85 Kg/ha	20	S
		KUPROS 35 WG	ES-00666	1,4-2,1 Kg/ha	NP	Phytophtora , Negrilla (Capnodium citri), Coletotricum, Xantomonas (de BBCH 0 a 39 y de BBCH 51-57)		
		CUPROZIN 35 WP	ES-00858	2,8 Kg/ha	14	1 Aplicación en pomelo, 2 en limón. Fitophtora (eficaz frente Phytophtora spp. Aplicar desde BBCH 81 al 85)		

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. ENFERMEDADES

ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Aguado *(Phytophthora spp.)*	OXICLORURO DE COBRE 37,5%	SANAGRICOLA WG	25044	0,1-0,3%	15	Aguado, gomosis, mal seco. Máx 2 aplicaciones y 5,6 Kg/ha y año	20	S
		NEORAM 37,5 WG	23987	0,1-0,3%	15	Aguado, gomosis. Máx 2 aplicaciones y 5,6 Kg/ha y año		
	OXICLORURO DE COBRE 38%	FLOWBRIX	24864	0,1-0,17%	14	De BBCH 15 a 89.	20	S
		INACOP L	16395	0,1-0,25%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 5 aplicaciones		
		CUPROFLOW	21670	0,1-0,25%	15	Aguado, gomosis, bacteriosis. Máximo 2 aplicaciones. Desde maduración del fruto hasta plazo de seguridad		
		CUPROFLOW NC	21633	0,1-0,25%	15	Aguado. Máximo 2 aplicaciones. Desde maduración del fruto hasta plazo de seguridad		
		CURENOX 38 FLOW BLUE	25157	0,1-0,26%	14	De BBCH 15 a 89. Máximo 4 aplicaciones		
		FLOWBRIX BLU	24957	0,11-0,17%	14	Desde BBCH 15 a 89. Máximo 4 aplicaciones		
	OXICLORURO DE COBRE 50%	COVICAMPO-50	12965	0,1%	15	Aguado, gomosis (Los tratamientos se darán en otoño, pulverizando hasta una altura de 1.50 m.)	20	S
		CUPROTEC	21565	0,1%	15	Max 2 aplicaciones en otoño		
		SANAGRICOLA WP	12070	0,075-0,15%	14	De BBCH 15 a 89		
		COBRELUQ-50	12605	0,075-0,2%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89)		
		TRAXI	21719					
		IKEBANA FUNGICIDA TOTAL	22599					
		AFROCOBRE M	12507	0,075-0,2%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 4 aplicaciones		
		IQV OXICLORURO 50	12677					
		CURENOX-50	13138					
		CUPROXI	13342					
		OXICOOP 50	14612					
		CUPRAFOR 50	15314					
		COBRELINE	16436					
		FARMACOP 50 PM	21329					
	OXICLORURO DE COBRE 50%	AGROCOBRE 50 WP AZUL	15524	0,075-0,2%	14	De BBCH 15 a 89	20	S
		HECATE PM	24916					
		DITIVER C PM	11854	0,075-0,2%	14	De BBCH 15 a 89. Máximo 4 aplicaciones		
		CURENOX 50 BLUE	12612					
		OXICOOP 50 AZUL PREMIUM	15543					
		OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.	16412					
		ALCOCOBRE-50	18840					
		IQV OXICLORURO 50 AZUL	25158					
		SANAGRICOLA 500 WG	18406	0,1-0,2%	14	Aguado, Bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 3 aplicaciones		
		CUPROSAN WG	24039					
		DRYCOP 50 DF	22209	0,1-0,2%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 3 aplicaciones		
		CUPROCAFFARO	21630	0,1-0,2%	15	Aguado (0.1-0.2%), gomosis, bacteriosis, Fomopsis, Hongos Endófitos (0.2%) BBCH 81-85		
		CUPROCAFFARO BLUE	21668					
		SULCOX WP	23699					
		OSSIRAME EXTRA 50 WP	23859	0,16-0,2%	14	Máximo 4 tratamientos		
		OSSIRAME 50 WP	24808					
		CUPER 50	22287	1,5 Kg/ha	15	Aguado (Los tratamientos se darán en otoño, pulverizando hasta una altura de 1.50 m.)		
		COVICAMPO 50 SC	22402	2 Kg/ha	15	Aguado, gomosis. Otoño de BBCH 81 a 89. Hasta una altura de 1.5 m		
	OXICLORURO DE COBRE 52%	COPPER KEY FLOW (**)	ES-00406	1-2,41 l/ha	15	Solo POMELO. Aplicar en otoño/ invierno	20	S
		CUPROXI FLO	ES-00979	0,10%	14	También alternaria y melanosis. BBCH 15-89		
		CUPRA INCOLORO	ES-00814	2,4 l/ha	15			
	OXICLORURO DE COBRE 70%	COVINEX 700 FLOW	24457	0,075%	15	Aguado y Mal seco (0.075%), Fomopsis y Hongos Endofitos (0.125%), Bacteriosis (0.054%). Desde BBCH 81 a 89.	20	S
		CUPER 70 FLOW-TRADE	24465	0,075%	15	Aguado, gomosis, mal seco (0.075%), Fomopsis y Hongos Endofitos (0.125%), Bacteriosis (0.054%). Desde BBCH 81 a 89.	20	S
	OXIDO CUPROSO 50%	COBRE NORDOX 50	11231	0,08-0,12%	NP	Bacteriosis, Fitophtora (1-2 aplicaciones). Solo en prefloración	20	S
		OXIMUR 50 PM	19910					
		CORAL	21829					

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. ENFERMEDADES

ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Aguado *(Phytophthora spp.)*	SULFATO CUPROCALCICO 12,4%	MANIFLOW	25251	1%	20	Aguado, Alternaria, Bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 3 aplicaciones	20	S
		POLTIGLIA FLOW 38,5	25252					
	SULFATO CUPROCALCICO 20%	POLTIGLIA 20 WP	19616	0,2%	14	Aguado, gomosis, alternaria, bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20	S
		BORDEAUX GOWAN WG	25046	0,2%	15	Aguado, gomosis, bacteriosis, fomopsis, hongos endofitos (Máximo 2 aplicaciones de BBCH 80 a BBCH 85)		
		CALDO BORDELES VALLES	23891	0,187-0,5 Kg/Hl	14	Aguado, Bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		BORDO COOP	16435	0,187-0,5 Kg/Hl	14	Aguado, gomosis, bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		CALDO MANICA 20 WG	25163	0,2-0,34%	14	Aguado, Alternaria, Pseudomonas. Máximo 4 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		CALDO BORDELES VALLES BLUE	13964	0,2-0,5%	14	Aguado, Bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		AGROBORDELES AZUL	19631					
		CALDO BORDELES MAC 80	11797	0,2-0,5%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		CUPERVAL	12569					
		CALDO BORDELES	12864					
		BORDO COOP AZUL	16275					
		CALDO BORDELES IQV	19005					
	SULFATO CUPROCALCICO 20%	BORDO MICRO	19064	0,2-0,5%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89	20	S
		CALDO BORDELES QUIMUR	19522					
		CALDO BORDELES KEY	20060					
		BOUILLIE MOP 20	20105					
		CALDO LAINCO	21286					
		CABOR	21716					
		BORMIX BLUE	21729					
		BORDELÉS LUQSA	23883					
		SANAGRICOLA BM WG	24018					
		POLTIGLIA 20 WG	25152	0,4-0,5%	14	De BBCH 15-89. Altura máxima pulverización 1,5 metros		
		CALDO BORDELES RSR	17223	4-5 Kg/ha	14	Aguado, gomosis y Chancro (de BBCH 15 a 89)		
		CRACK 20 WP	22949					
		RSP DISPERSS	23852					
	SULFATO TRIBASICO DE COBRE 19%	COBRESTAR	23179	0.47-0,56%	20	Aguado, gomosis, bacteriosis. Desde BBCH 90 a 50. Máximo 2 aplicaciones	20	S
	TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T25) + TRICHODERMA ATROVIRIDE (CEPA T11)	TUSAL (**)	24244	0,5-1 Kg/ha	NP	Solo POMELO. También fusariosis, pityum, rizoctonia y esclerotina	exento	S

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. ENFERMEDADES

ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Podredumbre de cuello o gomosis *(Phytophthora spp.*)	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS subesp. plantarum (cepa D747)	VALCURE (**)	ES-00866	2,5 l/ha	NP	Solo POMELO. 8 aplicaciones. Aplicación riego por goteo. Hasta BBCH 89	exenta	S
	FOSETIL-AL	FESIL WG	18795	0,25-0,3%	14	Por lo general, dosis máxima 9 Kg/ ha. Máximo 3 aplicaciones, intervalo 60 días. En riego por goteo: 1-25 gr/árbol . Máximo 10K/ha y 2 aplicaciones.	LIMÓN 150 POMELO 75	9
		DINAPIC	24926	0,25-0,3%	15	Dosis máxima 6 Kg/ ha. Máximo 4 aplicaciones.		
		ALIAL	24207	0,25-0,3%	15	Máximo 3 aplicaciones por campaña		
		POMBAL 80 WG	25505					
		MAESTRO 80 WG	25724					
		KATANGA EXPRESS	23711					
		CARFAL WG	23788					
		KATANGA WP	22730	0,25-0,3%	15	Máximo 3 aplicaciones.Intervalo entre aplicaciones 30-150 días.		
		ALIETTE WG	15907	0,25-0,3%	15	Por lo general, dosis máxima 9 Kg/ ha. Máximo 3 aplicaciones, intervalo 60 días. En riego por goteo: 1-25 gr/árbol . Máximo 10Kg/ha y 2 aplicaciones.		
		ALIAL 80 WG	25501	0,25-0,45%	15	Máximo 3 aplicaciones por campaña e intervalo entre 10-14 días		
		ALFIL	21650	250-300 g/Hl	15	Máximo 3 aplicaciones intervalo entre aplicaciones 90-120 días.		
		POMBAL	22875	250-300 g/Hl	15	Máximo 3 aplicaciones por campaña e intervalo entre aplicaciones 90-120 días.		
	FOSETIL-AL	KILATE	ES-00541	6 Kg/ha	14	1 aplicación. BBCH 37-81		
		KEYFOL WG						
		GOLBEX WG						
		OPTIX DISPERSS	ES-00504	6 Kg/ha	14	Máx. 4 aplicaciones. 2 en primavera y 2 en otoño. Aplicar cuando hojas alcanzan su tamaño total		
		FOSBEL 80 WG	25502	ver ficha	14	Condiciones de aplicación en ficha		
		ALFIL WG	25504					
	FOSFONATO POTASICO	CUNEB (**)	ES-00302	1,5-8,75 l/ha	15	Solo POMELO. 2 aplicaciones. Intervalos de 20 días. BBCH>40.	0,01	S
		PHYTORSARCAN (**)	ES-00303					
		FOSIKA (**)	ES-00304					
		LBG-01F34	25498	300-400 ml/Hl	15 pomelo 24 limón	De BBCH 79-89. Máximo 2 aplicaciones	0,01	S
	HIDROXIDO CUPRICO 13,6% + OXICLORURO DE COBRE 13,6%	AIRONE SC BLUE	24950	0,2-0,4%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis, fomopsis. (Máximo 2 aplicaciones)	20	S
		GRIFON	24951					
		AIRONE	24949					

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. ENFERMEDADES

ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Podredumbre de cuello o gomosis *(Phytophthora spp.*)	HIDROXIDO CUPRICO 35%	FUNGURAN-OH 50 PM	19709	1,3-1,8 Kg/ha	14	Tizón, aguado, gomosis (desde fruto empieza a colorear hasta maduración avanzada). Máximo 3 aplicaciones	20	S
		KDOS	22002	0,15-0,2%	21	Aguado, Gomosis (aplicar desde cuajado hasta fruto maduro apto consumo)		
	OXICLORURO DE COBRE 14% + HIDROXIDO CUPRICO 14%	CUPRANTOL DUO	ES-00863	3,5 Kg/ha	14	Aplicar durante BBCH 73-PS	20	S
	OXICLORURO DE COBRE 35%	KUPROS 35 WG	ES-00666	1,4-2,1 Kg/ha	NP	Phytophtora , Negrilla (Capnodium citri), Coletotricum, Xantomonas (de BBCH 0 a 39 y de BBCH 51-57)	20	S
		CUPROZIN 35 WP	ES-00858	2,8 Kg/ha	14	1 Aplicación en pomelo, 2 en limón. Fitophtora (eficaz frente Phytophtora spp. Aplicar desde BBCH 81 al 85)		
	OXICLORURO DE COBRE 37,5%	NEORAM 37,5 WG	23987	0,1-0,3%	15	Aguado, gomosis. Máx 2 aplicaciones y 5,6 Kg/ha y año	20	S
		SANAGRICOLA WG	25044	0,1-0,3%	15	Aguado, gomosis, mal seco. Máx 2 aplicaciones y 5,6 Kg/ha y año		
	OXICLORURO DE COBRE 38%	INACOP L	16395	0,1-0,25%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 5 aplicaciones	20	S
		CUPROFLOW	21670	0,1-0,25%	15	Aguado, gomosis, bacteriosis. Máximo 2 aplicaciones. Desde maduración del fruto hasta plazo de seguridad		
		FLOWBRIX	24864	0,10%	14	Desde BBCH 15 a 89.		
	OXICLORURO DE COBRE 50%	COVICAMPO-50	12965	0,1%	15	Aguado, gomosis (Los tratamientos se darán en otoño, pulverizando hasta una altura de 1.50 m.)	20	S
		CUPROTEC	21565	0,1%	15	Max 2 aplicaciones en otoño		
		SANAGRICOLA WP	12070	0,075-0,15%	14	De BBCH 15 a 89		
		COBRELUQ-50	12605	0,075-0,2%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89)		
		IKEBANA FUNGICIDA TOTAL	22599					
		AFROCOBRE M	12507	0,075-0,2%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 4 aplicaciones		
		IQV OXICLORURO 50	12677					
		CURENOX-50	13138					
		CUPROXI	13342					
		OXICOOP 50	14612					
		CUPRAFOR 50	15314					
		COBRELINE	16436					
		FARMACOP 50 PM	21329					
		AGROCOBRE 50 WP AZUL	15524	0,075-0,2%	14	De BBCH 15 a 89		
		HECATE PM	24916					
		DITIVER C PM	11854	0,075-0,2%	14	De BBCH 15 a 89. Máximo 4 aplicaciones		
		CURENOX 50 BLUE	12612					
		ALCOCOBRE-50	18840					
		IQV OXICLORURO 50 AZUL	25158					
		DRYCOP 50 DF	22209	0,1-0,2%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 3 aplicaciones		
		CUPROCAFFARO	21630	0,1-0,2%	15	Aguado (0.1-0.2%), gomosis, bacteriosis, Fomopsis, Hongos Endófitos (0.2%) BBCH 81-85		
		CUPROCAFFARO BLUE	21668					
		SULCOX WP	23699					
		OSSIRAME 50 WP	24808	0,16-0,2%	14	Máximo 4 tratamientos		
		COVICAMPO 50 SC	22402	2 Kg/ha	15	Aguado, gomosis. Otoño de BBCH 81 a 89. Hasta una altura de 1.5 m		

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. ENFERMEDADES

ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
Podredumbre de cuello o gomosis *(Phytophthora spp.)*	OXICLORURO DE COBRE 52%	COPPER KEY FLOW (**)	ES-00406	1-2,41 l/ha	15	Solo POMELO. Aplicar en otoño/ invierno	20	S
		CUPRA INCOLORO	ES-00814	2,4 l/ha	15		20	S
	OXICLORURO DE COBRE 70%	COVINEX 700 FLOW	24457	0,075%	15	Aguado, gomosis, mal seco (0.075%), Fomopsis y Hongos Endofitos (0.125%), Bacteriosis (0.054%). Desde BBCH 81 a 89.	20	S
		CUPER 70 FLOW-TRADE	24465					
	OXIDO CUPROSO 50%	CORAL	21829	0,08-0,12%	NP	Bacteriosis, Fitophtora (1-2 aplicaciones). Solo en prefloración	20	S
	SULFATO CUPROCALCICO 20%	POLTIGLIA 20 WP	19616	0,20%	14	Aguado, gomosis, alternaria, bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20	S
		BORDEAUX GOWAN WG	25046	0,2%	15	Aguado, gomosis, bacteriosis, fomopsis, hongos endofitos (Máximo 2 aplicaciones de BBCH 80 a BBCH 85)		
		BORDO COOP	16435	0,187-0,5 Kg/Hl	14	Aguado, gomosis, bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		CALDO BORDELES VALLES BLUE	13964	0,2-0,5%	14	Aguado, Bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		CALDO BORDELES MAC 80	11797	0,2-0,5%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		CUPERVAL	12569					
		CALDO BORDELES	12864					
		BORDO COOP AZUL	16275					
		CALDO BORDELES IQV	19005					
		BORDO MICRO	19064					
		CALDO BORDELES QUIMUR	19522					
		CALDO BORDELES KEY	20060					
		BOUILLIE MOP 20	20105					
		CALDO LAINCO	21286					
		CABOR	21716					
		BORMIX BLUE	21729					
		BORDELÉS LUQSA	23883					
		SANAGRICOLA BM WG	24018					
		CALDO BORDELES RSR	17223	4-5 Kg/ha	14	Aguado, gomosis y Chancro (de BBCH 15 a 89)		
		CRACK 20 WP	22949					
		RSP DISPERSS	23852					
	SULFATO TRIBASICO DE COBRE 19%	COBRESTAR	23179	0,47-0,56%	20	Aguado, gomosis, bacteriosis. Desde BBCH 90 a 50. Máximo 2 aplicaciones	20	S

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. ENFERMEDADES

ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
BACTERIOSIS	HIDROXIDO CUPRICO 13,6% + OXICLORURO DE COBRE 13,6%	AIRONE	24949	0,2-0,4%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis, fomopsis. (Máximo 2 aplicaciones)	20	S
		AIRONE SC BLUE	24950					
		GRIFON	24951					
	HIDROXIDO CUPRICO 50%	DROXICUPER-50	ES-01017	según enfermedad	15	Aplicar hasta 1.5 m de altura. Bacteriosis (1.5 Kg/ha), Hongos endofitos (1.5 Kg/ha), Aguado (0.6-0.8 Kg/ha), Fomopsis (1.5 Kg/ha)	20	S
		HIDROCUPER-50	ES-01018	1,5 Kg/ha	15	De BBCH 81-89		
	OXICLORURO DE COBRE 38%	INACOP L	16395	0,1-0,25%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 5 aplicaciones	20	S
		CUPROFLOW NC	21633	0,1-0,25%	15	Aguado. Máximo 2 aplicaciones. Desde maduración del fruto hasta plazo de seguridad	20	S
		CUPROFLOW	21670	0,1-0,25%	15	Aguado, gomosis, bacteriosis. Máximo 2 aplicaciones. Desde maduración del fruto hasta plazo de seguridad	20	S
		FLOWBRIX	24864	0,10%	14	Desde BBCH 15 a 89.	20	S
		FLOWBRIX BLU	24957	0,10%	14	Desde BBCH 15 a 89. Máximo 4 aplicaciones	20	S
		CURENOX 38 FLOW BLUE	25157	0,1-0,26%	14	De BBCH 15 a 89. Máximo 4 aplicaciones	20	S
	OXICLORURO DE COBRE 50%	CUPROCAFFARO	21630	0,2%	15	Aguado (0.1-0.2%), gomosis, bacteriosis, Fomopsis, Hongos Endófitos (0.2%) BBCH 81-85	20	S
		CUPROCAFFARO BLUE	21668					
		COBRELUQ-50	12605	0,075-0,2%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89)		
		TRAXI	21719					
		IKEBANA FUNGICIDA TOTAL	22599					
		AFROCOBRE M	12507	0,075-0,2%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 4 aplicaciones		
		IQV OXICLORURO 50	12677					
		CURENOX-50	13138					
		CUPROXI	13342					
		OXICOOP 50	14612					
		CUPRAFOR 50	15314					
		COBRELINE	16436					
		FARMACOP 50 PM	21329					
		HECATE PM	24916	0,075-0,2%	14	De BBCH 15 a 89		
		SANAGRICOLA 500 WG	18406	0,1-0,2%	14	Aguado, Bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 3 aplicaciones		
		CUPROSAN WG	24039					
		DRYCOP 50 DF	22209	0,1-0,2%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 3 aplicaciones		
		SULCOX WP	23699	0,1-0,2%	15	BBCH 81-85		
	OXICLORURO DE COBRE 70%	COVINEX 700 FLOW	24457	0,054%	15	Bacteriosis (0.054%). Desde BBCH 81 a 89.	20	S
		CUPER 70 FLOW-TRADE	24465	0,054%	15	Aguado, gomosis, mal seco (0.075%), Fomopsis y Hongos Endofitos (0.125%), Bacteriosis (0.054%). Desde BBCH 81 a 89.	20	S
	OXIDO CUPROSO 50%	COBRE NORDOX 50	11231	0,08-0,12%	NP	Bacteriosis, Fitophtora (1-2 aplicaciones). Solo en prefloración	20	S
		OXIMUR 50 PM	19910					
		CORAL	21829					
	SULFATO CUPROCALCICO 12,4%	MANIFLOW	25251	1%	20	Aguado, Alternaria, Bacteriosis (de BBCH 15 a 89). Máximo 3 aplicaciones	20	S
		POLTIGLIA FLOW 38,5	25252					

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. ENFERMEDADES

ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
BACTERIOSIS	SULFATO CUPROCALCICO 20%	POLTIGLIA 20 WP	19616	0,2%	14	Aguado, gomosis, alternaria, bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20	S
		BORDEAUX GOWAN WG	25046	0,2%	15	Aguado, gomosis, bacteriosis, fomopsis, hongos endofitos (Máximo 2 aplicaciones de BBCH 80 a BBCH 85)		
		BORDO COOP	16435	0,187-0,5 Kg/Hl	14	Aguado, gomosis, bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		CALDO BORDELES VALLES	23891	0,187-0,5 Kg/Hl	14	Bacteriosis. Máx. 3 aplicaciones. De BBCH15 a BBCH89		
		CALDO BORDELES VALLES BLUE	13964	0,2-0,5%	14	Aguado, Bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		AGROBORDELES AZUL	19631					
		CALDO BORDELES MAC 80	11797	0,2-0,5%	14	Aguado, gomosis, bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89		
		CUPERVAL	12569					
		CALDO BORDELES	12864					
		BORDO COOP AZUL	16275					
		CALDO BORDELES IQV	19005					
		BORDO MICRO	19064					
		CALDO BORDELES QUIMUR	19522					
		CALDO BORDELES KEY	20060					
		BOUILLIE MOP 20	20105					
		CALDO LAINCO	21286					
		CABOR	21716					
		BORMIX BLUE	21729					
		BORDELÉS LUQSA	23883					
		SANAGRICOLA BM WG	24018					
		POLTIGLIA 20 WG	25152	0,4-0,5%	14	De BBCH 15-89. Altura máxima pulverización 1,5 metros		
	SULFATO TRIBASICO DE COBRE 19%	COBRESTAR	23179	0,47-0,56%	20	Aguado, gomosis, bacteriosis. Desde BBCH 90 a 50. Máximo 2 aplicaciones	20	S
Mal Seco (*Plenodomus tracheiphilus*)	OXICLORURO DE COBRE 37,5%	SANAGRICOLA WG	25044	0,1-0,3%	15	Aguado, gomosis, mal seco. Máx 2 aplicaciones y 5,6 Kg/ha y año	20	S
	OXICLORURO DE COBRE 70%	COVINEX 700 FLOW	24457	0,075%	15	Aguado, gomosis, mal seco (0.075%), Fomopsis y Hongos Endofitos (0.125%), Bacteriosis (0.054%). Desde BBCH 81 a 89.	20	S
		CUPER 70 FLOW-TRADE	24465					
		ZZ-CUPROCOL	ES-00981	0,075	15	Geotrichum, 1-2 aplicaciones. De BBCH 10-89		
Armillaria	TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA ICC012) + TRICHODERMA GAMSII (CEPA ICC080)	BLINDAR	25924	2,5 Kg/ha	NP	Aplicación al realizar la plantacion. 1ª 5-7 días antes transplante. 2ª en el transplante	exento	S
Penicillium	TEBUCONAZOL	FOLICUR 25EW	18640	0,4%	NP		5	S
		TENOR	25305					
	AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPA DSM 14940) + AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPA DSM 14941)	BLOSSOM PROTECT (**)	25632	0,5-1,5 Kg/ha	NP	Solo POMELO. Penicillium	exento	S
OTROS HONGOS	DODINA 54,4%	SYLLIT MAX	ES-00390	1,5 l/ha	21	Podredumbre gris, alternaria. De BBCH 53-81	1,5	S
	OXICLORURO DE COBRE 35%	KUPROS 35 WG	ES-00666	1,4-2,1 Kg/ha	NP	Phytophtora , Negrilla (Capnodium citri), Coletotricum, Xantomonas (de BBCH 0 a 39 y de BBCH 51-57)	20	S
	PIRACLOSTROBIN	CABRIO WG	ES-00065	1,125 Kg/ha	14 días	Alternaria	2	2
	TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T34)	T34 BIOCONTROL	ES-00283	VER FICHA	NP	Sclerotinia. Ver condiciones de aplicación en la ficha	exento	S
	TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237)	TRI-SOIL (**)	ES-01152	2,5-5 Kg/ha	NP	Solo POMELO. Aplicar en el momento de la plantación	exento	S
NEMÁTODOS	PAECILOMYCES LILACINUS (CEPA 251)	LALNIX ACT WG	25595	VER FICHA	NP		exento	S
		BIOACT PRIME	ES-00402	0,75 l/ha	NP	1-4 aplicaciones a interalos de 60 días	exento	S

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. HERBICIDAS

EFECTO	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
HERBICIDAS	2, 4 -D	GENOXONE ZX	24954	1,25 l/100 litros	NP	1 aplicación año. Áreas no cultivadas	1	3
	ACIDO PELARGONICO 68%	BELOUKHA	ES-00222	16 l/ha	1	Para supresión de rebrotes. Máximo 2 tratamientos. BBCH 00-99	exento	S
	CARFENTRAZONA-ETIL 6%	SPOTLIGHT PLUS	25453	0,25-0,3 l/ha	7	1 aplicación	0,02*	0,1
	CLETODIM 18% [EC] P/V	BRIXTON	ES-01575	0,7-1,33 Kg/ha	7		0,1	S
	DIFLUFENICAN	SEMPRA	25827	0,375-0,75 l/ha	28	1 aplicación. Máx. 50% superficie. Ver condiciones en FICHA.	0,01*	S
		MOHICAN 50 SC	24085	0,5-0,7 l/ha	NP			
		MAMUT	24239					
	DIFLUFENICAN + GLIFOSATO	TRAPÍO	ES-00751	1,5-9 l/ha	14		0,01*+0,1	- + 0,5
		MOHICAN ENERGY	ES-00756					
		GULFSTREAM (*)	ES-00214	4 l/ha	NP	Solo LIMÓN		
	DIFLUFENICAN + METRIBUZIN	TAVAS	ES-00399	2 l/ha	14	No aplicar más de una vez cada dos años. Máx 50% parcela	0,01* + 0,1*	S + S
	DIFLUFENICAN + OXIFLUORFEN	ATHABEL	24445	1 l/ha	15	En ausencia brotes tiernos. Max. 1/3 superficie. En riego por goteo, max 1/5 superficie.	0,01*+ 0,01*	S + S
		IRYDIA	24558					
	DIFLUFENICAN 4% + GLIFOSATO 25%	SIROCO (*)	ES-00777	3-4 l/ha	14	Solo LIMÓN. De BBCH 10-19	0,01*+0,1	- + 0,5
	DIFLUFENICAN 4% + GLIFOSATO 16%	ZARPA	ES-00788	1,5-4,7 l/ha	14		0,01*+0,1	- + 0,5
	FLAZASULFURON	REGISTER WG	ES-01573	0,06-0,1 Kg/ha	NP		0,01*	0,01
		TERAFIT	ES-00654	0,06-0,2 Kg/ha	NP			
		BAYASANT WG	ES-01574					
		MINSK	ES-00578	0,2 Kg/ha	45	1 aplicación		
		REGISTER 25 WG	ES-00401	60-200 g/ha	NP	Aplicar en primavera bajo las filas		
		BAYASANT	ES-00408					
	FLORASULAM + PENOXULAM	RUEDO	ES-00104	0,08-0,1 l/ha	30	1 aplicación al año. En primavera	0,01* + 0,01*	S + S
	FLUAZIPOP-P-BUTIL	FUSILADE MAX	15814	1 l/ha	28	1 aplicación por campaña	0,01*	0,01
		FUSILADE MAX 12,5 EC	25006					
	FLUROXIPIR	TOMAHAWK	22779	1,5 l/ha	15	1 aplicación	0,01*	S
		HURLER 200	25400					
		NITIDE	ES-01188					
		KEYNYL	ES-01189					
		TIDEX	ES-01190					
		LODIN	ES-01196					
		STARANE-20	17856	1,5 l/ha	30	1 aplicación		
		REMINEL	25526					
		DISCOVERY	ES-00711	1,5-2 l/ha	15	Pulverización en suelo sin tocar los árboles		
	GLIFOSATO	HERBITON	ES-00724	1,5-5 l/ha	7	Dosis según m. hierba	0,1	0,5
		ROUNDUP ULTRA PLUS	ES-00725					
		ROUNDUP ULTIMATE	25441	1,5-7,5 l/ha	NP	Dosis según m. hierba y sistema de aplicación		
		ROUNDUP FUTURE	ES-01438	1-3,6 l/ha	7			
		ROUNDUP ENERGY PRO	ES-00726	2,4-4,8 l/ha	7	Cultivos no rastreros con más de 3-4 años. Dosis según m. hierba		
		TOUCHDOWN PREMIUM	ES-00743	2-5 l/ha	7	Cultivos no rastreros con más de 3-4 años. Dosis según m. hierba		
		RODEO PLUS	ES-01138	2-5 l/ha	28			
		HERBOLEX	ES-00742	3-10 l/ha	NA	Dosis según tipo de hieba, VER FICHA. Aplicar cultivos con más de 3-4 años. 2 aplicaciones		
		HERBOLEX 360	ES-00744					
		GLYFOON	25449	3-10 l/ha	NP	Dosis según m. hierba		

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. HERBICIDAS

EFECTO	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
HERBICIDAS	GLIFOSATO	GLIFOCHEM	ES-00787	3-5 Kg/ha	NA	Cultivo de más de 3-4 años. VER FICHA	0,1	0,5
		ROUNDUP XXI	ES-00699	3-5 l/ha	7			
		TOMCATO	ES-00790	3-7,6 l/ha	7	Cultivos no rastreros con más de 3-4 años. Dosis según m. hierba		
		ATILA	ES-00792					
		HILEO NT	ES-00599	3-8 l/ha	NP	1 aplicación. Dosis según tipo de hierba. VER FICHA. Edad mínima plantación 4 años.		
		CLINIC TF	ES-01098	8 l/ha	NP	Máximo 2 aplicaciones		
		GLYFOS TITAN	24505	Anuales 1,5-2,5 l/ha Vivaces 3-5 l/ha	NP	Cultivos no rastreros con más de 3-4 años.		
		PITON SUPREME	25507	Anuales 1,5-6 l/ha Vivaces 3-7,5 l/ha	NP			
		ACCELERATOR PROGRESS	23217	Anuales 2,4-4,8 l/ha Vivaces 4,8-8 l/ha	NP	Cultivos no rastreros con más de 3-4 años.		
		WINNER COOP. PLUS 45	23594					
		GLYFOS 45 AGRODAN	23595					
		KARDA	21491	Anuales 3-6 l/ha Vivaces 6-10 l/ha	NP	Cultivos no rastreros con más de 3-4 años.		
		GLYFOS PROGRESS	22312					
		BOOM EFEKT	25401					
	GLIFOSATO + MCPA	COCTEL GOLD	ES-01145	4 l/ha	NP	1-2 aplicaciones interalos 90 días. Aplicar en primeras etapas de desarrollo.	0,1* + 0,05*	0,5 + S
		GALAXIA MAX	ES-01146					
		GLISOMPA- PLUS	ES-01147					
	HALAUXIFEN-METIL 1,2% + FLUROXIPIR 28%	PIXXARO	ES-00363	0,4-0,7%	7	50% de la superficie en postemergencia mala hierba	0,02*+0,01*	S - S
	ISOXABEN	ROKENYL 50	18874	0,9 l/ha	NP		0,01*	S
	MCPA	PRIMMASIM	16844	1,5-2,5 l/ha	NP	1 tratamiento antes floración. Volumen caldo 400 l/ha	0,05*	S
		SP40K	11412					
		PROCER M-40	13599					
		RASS 40 SL	14527					
		U-46 SP FLUID	14594					
		CORBEN	14617					
		EMECEPEA 40K	14962					
		AHM/MCPA K40	15093					
		HERBIDENS	15118					
		MCPA 40 VALLE S	15432					
		MCPA 40 K SAL	17226					
		LINOXONE-N	18859					
		HERBIMUR MCPA	19520					
		AGROCER	19840					
		HERBICRUZ MCPA 40	22192					
		MCPA SAL POTASICA	21579					
		HERMENON EXTRA	14413	2,4 l/ha	NP			
		U-46 DMA FLUID	17232					
		PRIMMA MIX 60	21879					
		HERBICRUZ LINO 600	22263					
		MCPA DMA 500 SL	22720					
		CERIDOR 500	25483					

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. HERBICIDAS

EFECTO	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
HERBICIDAS	METAZACLORO	DUNKO	24895	0,75-1 l/ha	NP	A partir del segundo año y hasta 1 año antes de la primera cosecha	0,02*	S
		SULTAN N	25050	0,75-1 l/ha	NP	Plantaciones de cítricos a partir del segundo año y hasta 1 año antes de la primera cosecha		
	NAPROPAMIDA	DEVRINOL 45-F	16647	3,5-4,5 l/ha	NP	1 aplicación por campaña. Hasta BBCH 69	0,01*	S
	OXIFLUORFEN	GOAL SUPREME	23265	0,3 l/ha	NP	1 aplicación por campaña	0,01*	S
		GALIGAN 24 LE	21943	0,6 l/ha	15	1 aplicación		
		DRIBBLING 24 EC	22112					
		WINCHE 24 LE	23018					
		INTEIKE	23047	0,6 l/ha	21	1 aplicación		
		HEREU SUPER	23059					
		LASER	22218	0,6 l/ha	21			
		PROTIBEL	22826					
		FENFEN	23917					
		AGROXIFEN	23804	0,6 l/ha	NP			
		BAZZA	24722					
		SMERCH	ES-00825	0,625 l/ha	21	1 aplicación. Máximo 30% suelo		
		SI 533	ES-00826					
	PENDIMETALINA	STOM AQUA	ES-00680	2,5-2,6 l/ha	NP	sobre linea de cultivo en primavera u otoño	0,05*	0,1
		MOST MICRO HL (*)	25730	2,5-3 l/ha	NP	Solo LIMÓN. Sobre linea de cultivo en primavera u otoño		
		ORDAGO CAPS	ES-00499	3 l/ha	NP			
		PENDIFIN 400 SC	ES-01360	3,3 l/ha	NP	Aplicar en rodales		
		PENSHAR 40% SC	ES-00064	3,3-4,51 l/ha	NP	Aplicar entre líneas desde recolección hasta fijación del fruto.		
		ORDAGO SC	25551	3-5 l/ha	NP			
		SHARPEN 33% EC	ES-00063	4-5,5 l/ha	NP	Aplicar entre líneas desde recolección hasta fijación del fruto.		
		PENDINOVA	ES-00490	4-6 l/ha	NP			
	PENOXSULAM	VIPER	24022	0,5-0,75 l/ha	NP LIMÓN 120 POMELO	Aplicar tras la cosecha o antes del desarrollo de los frutos	0,01*	S
	PIRAFLUFLEN-ETIL	GOZAI	23138	0,25 - 0,35 l/ha	NP	1 aplicación por campaña. 250-300 l/ha de caldo	0,02*	S
	PROPAQUIZAFOP	AGIL	19140	según m. hierba. Ver ficha	NP	1 aplicación por campaña	0,02*	S
		SHOGUN	23651					
	QUIZALOFOP-P-ETIL	QUIZALOP	24081	Anuales 1,5-2,5 l/ha Vivaces 2-3,8 l/ha	NP	Aplicar antes del BBCH 70 (formación del fruto)	0,02*	S
		LEOPARD	24082					
		RUSNET	24515	Anuales 1-2 l/ha Vivaces 1-3 l/ha	35	1 aplicación. Desde primeras hojas visibles (BBCH 12) hasta fin de la floración (BBCH 69)		
		QUICK 5 EC	24812					
		QUIZALOP 5 EC	24598	Anuales 1-2,5 l/ha Vivaces 2-3,8 l/ha	NP	Aplicar antes del BBCH 70 (formación del fruto)		

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. FITOREGULADORES

EFECTO	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
AUMENTO TAMAÑO	ACIDO GIBERELICO + MCPA	FENGIB	16394	0,05-0,1%	5	Máximo 4 aplicaciones. Condiciones específicas en ficha	exento +0,05*	S+S
		CRETIOL	23855					
		FENHORT	23900	0,1-0,2%	5	Máximo 4 aplicaciones. Condiciones específicas en ficha		
	ACIDO GIBERELICO 10%	GIBBER 10 TB	ES-01531	200 gr/ha	NP	De BBCH 76-79. 1 aplicación	exento	S
	ACIDO GIBERELICO 4%	GIBBER 4 SL (*)	ES-01530	0,5 l/ha	NP	Solo LIMÓN. DE BBCH 76-79. 1 aplicación	exento	S
	DICLORPROP-P	CLEMENTGROS-PLUS	18926	0,1-0,2%	NP	Máximo 1 aplicación. Máximo 3 l/ha BBCH73. Dosis según cultivo	0,3	S
	TRICLOPIR	MAXIM	19684	1,5 tabletas/Hl	110	Desde caida frutos hasta 2 semanas después.	0,1	S
CUAJADO	ACIDO GIBERELICO + MCPA	FENGIB	16394	0,05-0,1%	5	Máximo 4 aplicaciones. Condiciones específicas en ficha	exento +0,05*	S+S
		CRETIOL	23855					
		FENHORT	23900	0,1-0,2%	5	Máximo 4 aplicaciones. Condiciones específicas en ficha		
	ACIDO GIBERELICO 40%	BERELEX 40 SG (*)	25361	1,6 gr/100 l	NP	Solo LIMON. Máx. 2 aplciaciones en caida de pétalos. Repetir en 3-4 semanas	exento	S
		PROGIBB 40 SG (*)	25307					
EVITAR CAIDA FRUTOS	ACIDO GIBERELICO + MCPA	FENGIB	16394	0,05-0,1%	5	Máximo 4 aplicaciones. Condiciones específicas en ficha	exento +0,05*	S+S
		CRETIOL	23855					
		FENHORT	23900	0,1-0,2%	5	Máximo 4 aplicaciones. Condiciones específicas en ficha		
	ACIDO GIBERELICO 10%	CRECENGEN MINOR	15500	10-21,6 tabletas/ha	NA	Máximo 1 aplicación en BBCH81	exento	S
		SEMEFIL (*)	15544	10-21,6 tabletas/ha	NA	SOLO LIMÓN. Máximo 1 aplicación en BBCH81		
	ACIDO GIBERELICO 2%	LUGER	ES-01208	0,34-0,64 l/ha	NP	1-2 tratamientos. De BBCH 65-73	exento	S
	ACIDO GIBERELICO 20%	SEMEFIL TAB (*)	15139	10-21,6 tabletas/ha	NA	SOLO LIMÓN. Máximo 1 aplicación en BBCH81	exento	S
	DICLORPROP-P	CLEMENTGROS-PLUS (**)	18926	0,06-0,1%	20	SOLO POMELO. BBCH 81	0,3	S
REGULADOR CRECIMIENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO 18,4%	FLORGIB TABLET (*)	ES-00196	2 tabletas /100 litros	NP	Solo LIMÓN. Precocidad, mejora cuajado(1-3 aplicaciones)	exento	S
	ACIDO GIBERELICO 2%	GIBER FRUIT LIQUIDO	15228	0,5-1,5 l/ha	NA	Máximo 1 aplicación en BBCH81	exento	S
		SEMEFIL 20 SL	15715					
		CLEMENFOL	15796					

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. POSTCOSECHA

ACCIÓN	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
HONGOS POSTCOSECHA (Penicillium spp, Geotrichum spp, Phytophtora spp, Botrytis spp…)	2-FENILFENOL	ORTODEX	23602	1,25%	NP	1 aplicación. 1 l de caldo /tonelada	10	10
		ORTOSOL 6500	23374	1,25%	NP			
		FRESHSTAR CLEAN OP	16092	0,15-0,2 l/Tm	NP			
		FUNG-CID ORTO ESPUMA	22600					
		FOAMEX	15041					
		DECCOSOL-MF	11312	0,2 l/Tm	NP			
		FOAMER	15608					
		ACTISEAL OP 13	21086	0,3 l/Tm	NP			
		FRUITGARD-OPP	25355	0,5-0,6%	NP	25 litros caldo/tonelada de fruta		
		ACTISEAL OP 10	25635	0,5-0,6%	NP	Aplicar en Drencher durante 25-30 segundos. La fruta se dejará escurrir y secar bien antes de ser introducida en la cámara		
		DECCO-OPP	24751	0,5-0,6%	NP			
		ORTOCIL	24783	1-2%	NP	Volumen de caldo 5 l/tonelada		
	AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPA DSM 14940) + AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPA DSM 14941)	AUREO SHIELD	ES-00466	2 gr/ l	NP	1-2 aplicaciones	exento	S
	CANDIDA OLEOPHILA (CEPA O)	NEXY	25971	233 gr/ 100 l	NP		exenta	S
	CERAS + 2-FENILFENOL	BRITEX-F	13094	0,5 l/ton.	NP		10	10
		WATERWAX-2P	15650	1 l/Tm	NP			
		CITRASHINE N-PE	16233					
		TEYCER ORIGINAL OP	21087					
		CITROSOL A OPP	ES-00171					
	CERAS + IMAZALIL	CITRASHINE N-IMZ-DOBLE	12752	1 L/Tm	NP	Aplicar el producto sin diluir directamente sobre la fruta mediante pulverización en tunel instalado sobre transportador y seguido de máquina de cepillos	LIMÓN 5 POMELO 4	10
		CITROSOL A IMAD 2	13487					
		CITROSOL A IMAD 3	15319					
		WATERWAX 3L	15834					
		WATERWAX 2L	15836					
		CITRASHINE N-IMZ	16232					
		TEYCER ORIGINAL I2	21090					
		TEYCER C 3L	23694					
		CITRASHINE CONSERVACIÓN IMZ-D	12741					
	CERAS + IMAZALIL + TIABENDAZOL	CITROSOL A IMAD 2 TBZ 5	ES-00609	1 L/Tm	NP	Aplicación en línea mediante dispositivos aplicadores de cera	LIMÓN 5 POMELO 4 +7	10 + 10
		TEYCER ORIGINAL I2T5	ES-00614					
		WATERWAX TTT/2L	ES-00615					
		CITRASHINE N-T-IMZ	ES-00618					
		CITRASHINE CONSERVACIÓN T-IMZ	ES-00619					
	CERAS + TIABENDAZOL	CITROSOL A TBZ 5	ES-00607	1 L/Tm	NP		7	10
		CITRASHINE N-T-50	ES-00620					
	FLUDIOXONIL	ACTISEAL F 60	ES-00206	0,07-0,1%	NP	Drencher o pulverización en línea (0,3-0,4%)	10	10
		SCHOLAR 230 SC	ES-00029	0,2-0,3 l/hl	NP			
	FOSETIL-AL	DECCOFOS	23760	0,5%	NP	Aplicar en Drencher	LIMÓN 150 POMELO 75	9
		FRUITGARD 80 AL	18915	0,3-0,4%	NP	Aplicar en Drencher a la entrada de la fruta		
	FOSETIL-AL + TIABENDAZOL	ACTISEAL AL	ES-00626	0,4%	NP		LIMÓN 150 POMELO 75 +7	9 + 10
	FOSFONATO POTASICO	POST-PHITE	ES-00298	0,7-1 l/100 litros	NA	Phytoptora. 1 aplicación	0,01	S
		SAVIAL POST	ES-00300					
		BLAKMUR	ES-00301					

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO. POSTCOSECHA

ACCIÓN	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR	PRODUCTO COMERCIAL	Nº REGISTRO	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	LMR UE	LMR USA
HONGOS POSTCOSECHA (Penicillium spp, Geotrichum spp, Phytophtora spp, Botrytis spp…)	IMAZALIL	FECUNDAL 500 EC	17682	0,3%	NP	En ceras al 18%: 0,4%	LIMÓN 5 POMELO 4	10
		FRUITGARD-I-50	24360	0,4%	NP	1 aplicación. 1 l de caldo /tonelada		
		FECUNDAL S-7,5	18135	2%	NP			
		DECCO IMZ S-7,5	ES-00813	0,025-0,06 l/ton.	NP	Penicillium. Drencher o pulverización. VER FICHA		
		NEOZIL 50 EC	25246	0,2-0,3%	NP	2 litros caldo/tonelada de fruta		
		CITROSOL 500	19574	0,4-0,6%	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
		DECCOZIL 50	21034					
		FRUITGARD-IS-7,5	24335	0,5-0,6%	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
		IMACIDE 7,5 LS	ES-00150					
		ACTISEAL I 7,5	ES-00170					
		BRILLAQUA 2IZ	16124	1 l/ton.	NP			
		BRITEX I	18362					
		BRITEX I-3	21213					
		NEOZIL 10 SL	25302	1,5-1,875%	NP	1-2 Litros de caldo/tonelada de fruta		
		DECCOZIL S-7,5	15457	2,6-4%	NP	Con cera 2,6-4% 1l/ton. Sin cera 1,6-2,13% 1,6 a 2 l/ton.		
		CITROSOL 7,5 LS	19993					
		STOCK LS	21850					
		FRUITFOG-I	23886	24 gr/ton	NP			
		ACTISEAL I 22.5	21082	según forma de aplicar	NP	Forma y época de aplicación en FICHA		
	IMAZALIL + 2-FENILFENOL	BRIOZIL	22868	0,5-0,6%	NP	1 aplicación. Dosis pomelo 0,5%	LIMÓN 5 POMELO 4 + 10	10 + 10
		CITROCIL (**)	18537	0,5-0,6%	NP	Solo POMELO. Aplicación mediante pulverización o ducha (Drencher) o inmersión de la fruta en el caldo preparado		
		PHILABUSTER 400 SC	24278	ver dosis en ficha	NP			
		ACTISEAL IT	ES-00611	0,4-0,5%	NP			
		FRUITGARD 70 (*)	ES-00605	0,5 l/100 litros	5	Solo LIMÓN		
		TEYCER ORIGINAL I3T5	ES-00594	1 l/ton.	NP	1 aplicación		
		TEYCER ORIGINALS 10 I2T5	ES-00600					
		BRITEX TI	ES-00617					
	PIRIMETANIL	DECCOPYR	ES-00168	0,2%	NP		8	10
		PENBOTEC 400 SC	ES-00851	0,25-0,5%	NP			
		CITRASHINE N PYR	ES-01276	1 l/ton.	1	Tratamiento pulverización automática en línea		
		DECCOPYR POT	ES-00186	30 gr/tonelada	NP			
		XEDATHANE 40	ES-01258	Mirar observaciones	NP	Dosis según forma de aplicación		
	PIRIMETANIL + ACEITE DE CLAVO	XEDATHADEN 20	ES-00255	250 ml/Hl	NP	Aplicar en Drencher o inmersión a la entrada de la fruta	8+exento	10+S
	TEBUCONAZOL	PILCLYN	24786	15 gramos/100 litros	NP	100 litros de caldo para 40 toneladas de fruta	5	S
	TIABENDAZOL	BRILLAQUA -ST	ES-00604	1 l/ton.	NP	1 aplicación	7	10
		WATERWAX TTT	ES-00616					
		ActiSeal T 60	ES-00602	VER OBSERV.	NP	Dosis según sistema de aplicación		
Desverdizado	ETILENO	FRUTARGAS	25628	0,025-0,25 l/m3	NP		exento	S
		NITROETIL	ES-00294	0,025-0,25%	NP			
		FRUTIL	ES-00036	1-2500 ppm	NP			
		AZETHYL	25938	0,025-0,25 l/m3	NP			
Mejora calidad	TRICLOPIR	TOPPER (*)	ES-00109	2 tabletas /100 litros	3	Solo LIMÓN. 1 aplicación. 100 litros caldo/ 7-10 toneladas	0,1	S
Retrasar envejecimiento y evitar pérdida de peso	CERAS + IMAZALIL	CITRASHINE N-IMZ-DOBLE	12752	1 L/Tm	NP		LIMÓN 5 POMELO 4	10

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

TRATAMIENTOS POSTCOSECHA LIBRES DE PESTICIDAS

PLAGA O ENFERMEDAD	PRODUCTO	PRODUCTO COMERCIAL	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	DOSIS MÁX	CERTIFICADO
citrosol stay fresh with innovation **CITROSOL** **HONGOS POSTCOSECHA** ***(Penicillium spp, Geotrichum spp, Phytophtora spp, Botrytis spp…)***	**E-202**	Fung-Cid Gras SP	1-4%	NP	Aditivo alimentario. Aplicar el producto directamente sobre la fruta por sistema drencher o por inmersión.	Dosis máxima 20 mg/kg	Good manufact. practice
	Bicarbonato sódico	FUNG-CID BIO BNa	6-18%	NP	Insumo para la producción ecológica. Aplicar el producto directamente sobre la fruta por sistema drencher, por inmersión o sistema drenchonline	—	ECOLÓGICO NOP ORGANIC BIOCARE by CITROSOL
	Detergente	DETERSOL/ ESSASOL	0,5- 7%	NP	Aplicar por inmersión ó en cortina de espuma	—	ECOLÓGICO BIOCARE by CITROSOL
	Detergente	NEGROL	0,5-1%	NP	Aplicar por inmersión ó en cortina de espuma	—	
	Detergente	DETERSOL-BIO	0,5-1%	NP	Aplicar por inmersión ó en cortina de espuma	—	BIOCARE by CITROSOL VEGANO ECOLÓGICO
	Ácido peracético + Peróxido de hidrógeno	CITROCIDE PLUS	0,2-0,4%	NP	Coadyuvante tecnológico. Insumo para la producción ecológica. Aplicar el producto por sistema drencher, por inmersión o sistema drenchonline	—	ECOLÓGICO NOP ORGANIC BIOCARE by CITROSOL
	Ácido peracético + Peróxido de hidrógeno	CITROCIDE PC	0,6%	NP	Coadyuvante tecnológico. Insumo para la producción ecológica. Aplicar el producto por sistema drencher, por inmersión o sistema drenchonline	—	ECOLÓGICO NOP ORGANIC BIOCARE by CITROSOL
	E-903	PLANTSEAL CI-CONTROL	1 l/T	NP	Aplicar el producto directamente sobre la fruta mediante aplicador de cera	Dosis máxima 200 mg/kg	VEGANO
	E-903	CITROPROTECT	1- 2%	NP	Aplicar mediante ducha (Sistema “drencher”) o inmersión.	Dosis máxima 200 mg/kg	Good manufact. practice
	E-903	CITROPROTECT PLUS	2- 3%	NP	Aplicar mediante ducha (Sistema “drencher”) o inmersión.	Dosis máxima 200 mg/kg	Good manufact. practice
	Recubrimiento Spray Final de línea	GREENSEAL LEMON SPRAY	-	NP	Aplicar directamente sobre la capa superior de los limones/pomelos encajados	—	Good manufact. practice

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

TRATAMIENTOS POSTCOSECHA LIBRES DE PESTICIDAS

PLAGA O ENFERMEDAD	PRODUCTO	PRODUCTO COMERCIAL	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	DOSIS MÁX	CERTIFICADO
SANIFRUIT **HONGOS POSTCOSECHA** ***(Penicillium spp, Geotrichum spp, Phytophtora spp, Botrytis spp…)***	**E-202 + EXTRACTOS VEGETALES**	SANI D	2%	NP	Aplicar en Drencher o en balsa a la entrada de la fruta	Dosis máxima 20 mg/kg	ZERYA
	E-202 + EXTRACTOS VEGETALES	SANI D FREE	3%	NP			
	Extractos vegetales	SANI D GREEN	2%	NP	Aplicar en Drencher o en balsa a la entrada de la fruta	-	ECOLÓGICO
	Extractos vegetales	SANI L	5%	NP	Aplicar diluido en agua mediante sistemas de pulverización en linea	QS	ECOLÓGICO
	Detergente Biodegradable	SANICLEAN	10%	NP	Utilizar el producto mediante aplicación gota a gota previa dilución. Aplicar 0,33 l/Tm	-	
	Detergente ecológico	SANICLEAN GREEN	10%		Utilizar el producto mediante aplicación gota a gota previa dilución. Aplicar 0,33 l/Tm	-	ECOLÓGICO
	E-202	SANI C	2,5%	NP	Aplicar en linea mediante aplicadores diluido en la cera.	Dosis máxima 20 mg/kg	
	E-473	SANI RC	5,0%	NP	Producto para alargar la integridad de la piel, aplicar diluido en cera 1-1,2 l/t	-	
	E-473	SANI RC L	5,0%	NP	Producto para alargar la integridad de la piel, aplicar diluido en cera 1-1,2 l/t	-	
	Peróxido de Hidrógeno	DRENPUR PH BIO	0,1-0,4% drencher o balsa / 1,25% línea	NP	Producto para alargar la integridad de la piel, aplicar diluido en cera 1-1,2 l/t	-	ECOLÓGICO
	Peróxido de Hidrógeno	DRENPUR PH	0,1-0,4% drencher o balsa / 1,25% línea	NP	Aplicar por drencher, balsa o pulverización en línea	-	

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

TRATAMIENTOS POSTCOSECHA LIBRES DE PESTICIDAS

PLAGA O ENFERMEDAD	PRODUCTO	PRODUCTO COMERCIAL	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	DOSIS MÁX	CERTIFICADO
DECCO **HONGOS POSTCOSECHA** ***(Penicillium spp, Geotrichum spp, Phytophtora spp, Botrytis spp…)***	**Microorganismo - Biopesticida *Candida oleophila strain-O***	NEXY (Registro nº: 25971)	33 g/100 lt	NP	Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		ECOLÓGICO. ECOCERT
	E-202	DECCOPLUS	0,4 - 1,5%	NP	Aplicar en drencher o en balsa a la entrada de la fruta ó por pulverización. Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		
	E-202	DECCO AEROSOL PLUS		NP	Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		
	Ácido Peracético + Peróxido de Hidrógeno	DECCOSAN FH	0,1-0,6%	NP	Aplicar por drencher, balsa o pulverización en línea. Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		ECOLÓGICO. CAAE
	Tensoactivos no iónicos <5% (detergente)	ECOCLEANER LINE			Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		ECOLÓGICO. CAAE
	Sales carbónicas	DECCO pH	2-4%	NP	Aplicar en Drencher o en balsa a la entrada de la fruta. Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		ECOLÓGICO. CAAE
	Hipoclorito	DECCOKLOR MAX	0,1%	NP	Desinfección agua de lavado. Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		
	Tensoactivos no iónicos <5% (detergente)	DECCO R2	1%	NP	Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		
	Tensoactivos no iónicos <5% (detergente)	DECCOSOL MAX	0,2-1%	NP	Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		
	Tensoactivos no iónicos <5% (detergente)	DECCOSOL	1%	NP	Aplicar por inmersión ó en cortina de espuma. Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		ECOLÓGICO. CAAE
	Tensoactivos no iónicos <5% (detergente)	DECCOSOL NATURE	0,2-1%	NP	Aplicar en drencher o en balsa a la entrada de la fruta. También puede aplicarse en pulverización on-line. Consulte Servicio Técnico de DECCO		
	E-473	DECCOPROTECT	5-10%	NP	Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		
	E-473	DECCOPROTECT DRENCHER	5-10%	NP	Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		
	E-473	NATURCOVER	1 - 1,2 lt/Tm	NP	Aplicar en linea mediante spraying Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		
	Ácido Glicólico Glicólico	DECCO AEROSOL ULTRA			Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		
	Ácido hipocloroso	DECCO Bio			Consulte con el Servicio Técnico de DECCO		

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

TRATAMIENTOS POSTCOSECHA LIBRES DE PESTICIDAS

PLAGA O ENFERMEDAD	PRODUCTO	PRODUCTO COMERCIAL	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	DOSIS MÁX	CERTIFICADO
AgroFresh We Grow Confidence™	**Detergente biodegradable**	FRESHSTART CLEAN	0,2L/Tm	NP	limpieza de frutos en postcosecha		ECOLÓGICO. CAAE
	Detergente biodegradable	FRESHSTART CLEAN PACK	Inicial:0,5% - 1%	NP	limpieza de frutos en postcosecha		ECOLÓGICO. CAAE
	Detergente biodegradable + Conservantes	FRESHSTART CLEAN PLUS	0,1L/Tm	NP	Detergente biodegradable + Conservantes		ECOLÓGICO. CAAE
	Peróxido de hidrógeno 25%. + Ácido peracético 15%	FRESHSTART DISINFECT 25-15	0,2%	NP	Modo de empleo: Drencher o inmersión en balsa.		ECOLÓGICO. CAAE
	Peróxido de hidrógeno 25% + Ácido peracético 5%	FRESHSTART DISINFECT 25-5	0,4%	NP	Modo de empleo: Drencher o inmersión en balsa.		ECOLÓGICO. CAAE
AGROFRESH **HONGOS POSTCOSECHA** ***(Penicillium spp, Geotrichum spp, Phytophtora spp, Botrytis spp…)***	**Peróxido de hidrógeno7,5%**	FRESHSTART DISINFECT 7.5	0,04%	NP	Desinfectante para el agua de lavado y/o		ECOLÓGICO. CAAE
	Absorbedor de etileno para cámaras de conservación y contenedores	TEXTAR ABSORBER FILTER		NP			ECOLÓGICO. CAAE
	Peróxido de hidrógeno 25% + Ácido peracético 5%	TEXTAR BIOC X 25-5	0,5-1%	NP	higienización y desinfección total de superficies, envases y herramientas en la industria hortofrutícola		ECOLÓGICO. CAAE
	Hidrógeno carbonato de sodio	TEXTAR SECURE	1 - 2%	NP	Modo de empleo: Drencher/Balsa		ECOLÓGICO. CAAE
	Conservación y cicatrización de los frutos E-202	TEXTAR Preserve	2,0%	NP	Modo de empleo: Drencher/Balsa		
	Recubrimiento vegetal E-903	VITAFRESH BOTANICALS LIFE 18	1 L/t	NP			VEGANO
	Recubrimiento vegetal E-473	VITAFRESH BOTANICALS PROTECT	3,2%	NP	Sucroésteres de ácidos grasos. Modo de empleo: Drencher/Balsa		
	Recubrimiento E- 914, E-904	Teycer Originals Total 12	1 – 1,5 L/t	NP	Recubrimiento especial para desverdización y conservación		

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

ailimpo
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo

TRATAMIENTOS POSTCOSECHA LIBRES DE PESTICIDAS

PLAGA O ENFERMEDAD	PRODUCTO	PRODUCTO COMERCIAL	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES	DOSIS MÁX	CERTIFICADO
AgroFresh We Grow Confidence™ **AGROFRESH** **HONGOS POSTCOSECHA** (*Penicillium spp, Geotrichum spp, Phytophtora spp, Botrytis spp…*)	**Recubrimiento E- 914, E-905**	Teycer Originals Total 14	1 – 1,5 L/t	NP	Recubrimiento especial para desverdización y conservación		
	Recubrimiento E- 914, E-906	Teycer Originals Total 18	1 L/t	NP	Recubrimiento especial para desverdización y conservación		
	Recubrimiento E- 914, E-907	Teycer Originals Total 21	1 L/t	NP	Recubrimiento diseñada para los mercados que exigen un alto brillo en el fruto.		
	Recubrimiento E- 914, E-906	Teycer Originals Preserve	1 – 1,2 L/t	NP	Recubrimiento con conservantes		
	Recubrimiento E- 903, E-904	Teycer Originals Prime 12	1 - 1,5 L/t	NP	Recubrimiento especial para desverdización y conservación		
	Recubrimiento E- 903, E-905	Teycer Originals Prime 18	1 L/t	NP	Recubrimiento Brillo y protección natural		
	Recubrimiento E- 903, E-906	Teycer Originals Prime 21	1 L/t	NP	Recubrimiento con brillo extra		
	Recubrimiento E- 904	Teycer Originals Bright	300 - 500 mL/t	NP	Recubrimiento con alto brillo en la última etapa de la confección		
	Recubrimiento E- 473	Teycer Originals Leaf	1,3 – 1,5 L/t	NP	Recubrimiento especial para frutos cítricos con hoja		

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales

Versión 17-2023
Revisión 00
Fecha 10.11.2023

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS POR AILIMPO EN LIMÓN Y POMELO

NOTAS:

DEBIDO A LOS CONTINUOS CAMBIOS EN LAS AUTORIZACIONES DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS, DEBE CONSULTARSE EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DEL MAPA (VER ENLACE), ANTES DE APLICAR CUALQUIER PRODUCTO O PARA AMPLIAR INFORMACION
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp

LA LISTA DE NOMBRES COMERCIALES NO ES EXHAUSTIVA. TAMPOCO SE INCLUYEN OTRAS DENOMINACIONES COMUNES QUE SE PUEDEN CONSULTAR EN LA WEB DEL MAPA

No se incluyen las posibles autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios para limón y pomelo que puedan concederse. Consultar web del MAPA

NP: No procede
*** Indica el límite de determinación analítica**
S Sin LMR

(*) **Producto que solo está autorizado en limón**

(**) **Producto que solo está autorizado en pomelo**

PRODUCTOS CON PERIODO DE GRACIA PARA SU USO. Ver condiciones en las observaciones